

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei, din 27.05.2016

În vigoare de la 22 iulie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 554bis din 22 iulie 2016. Formă aplicabilă la 13 septembrie 2018.

1. INTRODUCERE

1.1. Scurtă descriere a Planului de management

Planul de management al ariei protejate ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei constituie un act de reglementare a tuturor activităților ce se derulează în interiorul ariei protejate pentru a se asigura atingerea obiectivului general de conservare pentru care aceasta a fost constituită.

ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, a fost declarată arie naturală protejată de interes comunitar, prin Hotărârea Guvernului [nr. 1284/2007](#) privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de management, în conformitate cu principiul conservării biodiversității și cu cel al dezvoltării durabile, integrează obiectivele de conservare a biodiversității cu cele de dezvoltare socio - economică ale comunităților locale și gestionarilor resurselor naturale, având prioritate obiectivele de conservare, conform scopului/tipului de arie naturală protejată și speciilor de interes comunitar ce au stat la baza declarării sale.

Planul este structurat pe mai multe părți: o parte generală privind structura și aplicarea planului, o parte ce descrie aria naturală protejată cu toate componentele sale de interes, un capitol referitor la evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar, un capitol cu privire la scopul și obiectivele Planului de management și acțiunile propuse pentru atingerea sau menținerea stării de conservare favorabilă, monitorizarea acțiunilor din Planul de management; alocarea resurselor financiare și prioritizarea activităților.

Planul de management are caracter oficial, iar prevederile sale sunt obligatoriu de respectat pentru administratorii ariei, proprietarii sau administratorii de terenuri și oricare persoane fizice ori juridice care au interese în aria naturală protejată.

Aprobarea de către autoritățile publice centrale a Planului de management legiferează respectarea condițiilor impuse de acesta pentru gestionarea măsurilor de conservare și protecție a mediului.

1.2. Scurtă descriere a ariei naturale protejate

Aria naturală protejată, cu o suprafață de 4536,4 ha, a fost declarată pentru conservarea speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice.

Aria naturală protejată se situează în partea centrală a României, zona depresionară de la Curbura internă a Carpaților, fiind formată din trei suprafețe/arii diferite: Dumbrăvița, Rotbav și Măgura Codlei. În cuprinsul său sunt incluse integral două arii protejate de nivel național și una de nivel internațional - Sit Ramsar. Aceasta prezintă un mozaic de habitate, de la zone umede naturale și antropizate în partea cea mai joasă altitudinal, până la terenuri cu pante de peste 45°, acoperite cu pădure și stâncării în sectoarele cele mai înalte. Două dintre cele trei arii ale sitului - Dumbrăvița și Rotbav sunt caracterizate de terenuri deschise și zone umede, formate din mai multe tipuri de habitate: vegetație emersă - stufăriș, păpuriș, vegetație natantă și submersă, suprafețe de apă liberă de diverse adâncimi, maluri/diguri de pământ, mâl - îndeosebi rezultat în urma vidării bazinelor pentru recoltarea peștelui, sălcete/răchitișuri, canale, lunci ale pâraielor și râului Olt, terenuri agricole cultivate, pășuni, fânețe, terenuri abandonate, pâlcuri de arbuști. Se diferențiază trei tipuri principale de habitate: zone umede, zone de terenuri deschise și păduri.

Zonele umede apar îndeosebi în ariile Dumbrăvița și Rotbav. Acestea sunt reprezentate de specii de floră și tipuri de vegetație caracteristice, dominând *Phragmites australis*, *Typha latifolia*, *Typha angustifolia*, specii de *Carex* și mai puțin specii ca *Phalaris arundinacea* și *Glyceria maxima*. Plantele submerse sunt reprezentate, în general, de specii de *Potamogeton*, specii de *Lemna*, *Elodea canadensis*, *Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum spicatum*. În două zone - brațele "moarte" ale Oltului de la Măieruș-Arini și Hăghig, apare *Nuphar lutea*. Dintre speciile de plante lemnoase, cele mai mari suprafețe - îndeosebi din lunca Oltului, le ocupă *Salix fragilis*, *Salix alba* și *Salix cinerea*, ce formează în unele sectoare pâlcuri și chiar sălcete/răchitișuri. Cele mai importante tipuri de vegetație din punct de vedere avifaunistic, sunt *Scirpo-Phragmitetum*, *Typhetum latifoliae*, *Typhetum-angustifoliae* și în mai mică măsură *Caricetum*.

Zonele de terenuri deschise sunt în cea mai mare parte reprezentate de pășuni, terenuri agricole și fânețe și pe suprafețe mici de pășuni cu arbori - pășuni împădurite/arbuști izolați, în pâlcuri sau benzi. Toate aceste tipuri de habitate predomină în ariile Dumbrăvița și Rotbav ale sitului. În general, terenurile cultivate au suprafețe de sub 1 ha, apărând o mozaicare a culturilor. Fânețele sunt reprezentate în general prin asociații vegetale mezofile, în mică măsură higrofile. Predomină gramineele, dar în cuprinsul covorului vegetal apar și specii de orhidee, fabacee sau din alte familii botanice. Habitatele de terenuri deschise se modifică în timp și prin trecerea de la un mod la altul de folosință, cel mai adesea de la fâneată sau pășune la teren agricol cultivat.

Pădurile sunt răspândite în procent de peste 90% din suprafața ariei Măgura Codlei și sub 25% din aria Dumbrăvița, dar lipsesc din aria Rotbav. Predomină pădurile de foioase, îndeosebi cele de fag - *Fagus sylvatica*, urmate de cvercinee - *Quercus robur*, *Quercus petraea*. În aceste arborete apar și alte specii de foioase, în proporții mai mici, precum: *Fraxinus excelsior*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, *Acer platanoide*, *Acer pseudoplatanus*, *Cerasium avium*. Există și parcele silvice ocupate de plantații de rășinoase,

precum: pin silvestru - *Pinus sylvestris*, molid - *Picea abies*. Făgetele mature naturale, cu bună regenerare, se dezvoltă pe versanții abrupti și cea mai mare parte a piemontului Măgurii Codlei. Cvercineele, reprezentate de *Quercus robur*, ocupă întreaga suprafață de pădure din aria Dumbrăvița - pădurea Noului, iar celelalte suprafețe unde domină gorunul - *Quercus petraea* se întâlnesc în zonele mai joase ale Măgurii Codlei. Un element foarte important pentru speciile de păsări de interes comunitar îl constituie prezența lemnului mort pe picior și doborât, în multe parcele în procente ridicate la hectar.

Principalele activități umane desfășurate în cuprinsul ariei, sunt: piscicultura, agricultura, creșterea animalelor - pășunatul, silvicultura și exploatarea forestieră, pescuitul sportiv și activități de agrement.

1.3. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată și la elaborarea Planului de management

Primele acte legale care au stat la baza instituirii regimului de protecție pentru această arie protejată au fost Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 226/2003 privind declararea ariei naturale protejate "Lacul și heleșteul nr. 10 Dumbrăvița" și Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, prin care au fost declarate ariile naturale protejate Complexul Piscicol Dumbrăvița și Rotbav.

Complexul piscicol Dumbrăvița a fost declarat sit Ramsar prin Hotărârea Guvernului nr. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanță internațională.

Declararea ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei s-a făcut pe baza Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, situl se bazează pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea și aprobarea Planului de management are la bază următoarele acte normative:

a. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;

d. Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;

- e. Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice [nr. 1052/2014](#) privind aprobarea [Metodologiei](#) de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare;
- f. Legea [nr. 5/2000](#) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;
- g. Legea apelor [nr. 107/1996](#), cu modificările și completările ulterioare;
- h. Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/2010 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analiza documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial;
- i. Legea [nr. 101/2011](#) pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată;
- j. Ordinul ministrului mediului și ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale [nr. 203/14/2009](#) privind [Procedura](#) de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatică;
- k. Ordinul ministrului mediului [nr. 464/2009](#) pentru aprobarea [Normelor tehnice](#) privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- l. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile [nr. 410/2008](#) pentru aprobarea [Procedurii](#) de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din floră și, respectiv, faună sălbatică și a importului acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- m. Ordinul ministrului mediului [nr. 979/2009](#) privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele [nr. 4A](#) și [4B](#) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național;
- n. Legea [nr. 46/2008](#) - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- o. Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 139/2005](#) privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 38/2006](#), cu modificările și completările ulterioare;
- p. Ordinul ministrului mediului și pădurilor [nr. 1540/2011](#) pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare;
- q. Legea [nr. 171/2010](#) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;
- r. Ordinul ministrului mediului și pădurilor [nr. 3814/2012](#) pentru aprobarea [Normelor tehnice](#) privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, cu modificările și completările ulterioare;
- s. Legea [nr. 100/2010](#) privind împădurirea terenurilor degradate;

t. Legea [nr. 407/2006](#) vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare;

u. Hotărârea Guvernului [nr. 1679/2008](#) privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic [nr. 407/2006](#), precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;

v. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor [nr. 44/1195/2011](#) pentru aprobarea [Normelor](#) privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare;

w. Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 23/2008](#) privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 317/2009](#), cu modificările și completările ulterioare;

x. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului și pădurilor [nr. 159/1266/2011](#) privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate;

y. Legea fondului funciar [nr. 18/1991](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare;

z. Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 34/2013](#) privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar [nr. 18/1991](#), cu modificările și completările ulterioare;

aa. Hotărârea Guvernului [nr. 1064/2013](#) privind aprobarea [Normelor metodologice](#) pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 34/2013](#) privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar [nr. 18/1991](#), cu modificările și completările ulterioare;

bb. Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 3/2015](#) pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea [art. 2](#) din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 104/2015](#), cu modificările și completările ulterioare;

cc. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor [nr. 352/636/54/2015](#) pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare;

dd. Legea [nr. 350/2001](#) privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

ee. Hotărârea Guvernului [nr. 1076/2004](#) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

ff. Ordinul ministrului mediului și pădurilor, ministrului administrației și internelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea **Metodologiei** de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

gg. Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea **Ghidului metodologic** privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

hh. Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea **Convenției** privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

ii. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

jj. Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;

kk. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice;

ll. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice;

mm. Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea **Normelor** speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, cu modificările și completările ulterioare;

nn. Legea nr. 5/1991 pentru aderarea României la Convenția asupra zonele umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice;

oo. Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție;

pp. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009 cu modificările și completările ulterioare.

1.4. Procesul de elaborare a Planului de management

Planul de management a fost elaborat ca un proces transparent, prin implicarea și consultarea factorilor interesați, conform legislației în vigoare.

Prezentul Plan de management s-a elaborat în cadrul proiectului POS axa 4: " Managementul durabil al ariilor protejate Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, Pădurea Bogății și Pădurea Bogata".

Elaborarea planului, conform cerințelor contractuale ale proiectului și prevederilor legale în vigoare, a urmat mai multe etape, astfel:

1) inițial s-au demarat activitățile de colectare, analiză și interpretare a datelor de ordin general disponibile, precum și de completare a acestora cu date rezultate din studiile existente, publicate sau nepublicate;

2) în cadrul proiectului, s-au efectuat studii de inventariere, identificare a presiunilor și amenințărilor și de evaluare a stării de conservare a speciilor

pentru care a fost desemnată aria protejată, prin implicarea experților pentru fiecare domeniu;

3) pentru fiecare specie de interes comunitar s-au propus măsuri de conservare în vederea asigurării stării de conservare favorabilă;

4) în urma analizării tuturor studiilor, a livrabililor și a bazei de date existente, s-a trecut la etapa întocmirii Planului de management de către experți în colaborare cu beneficiarul proiectului, custode și alți factori interesați;

5) o componentă esențială a elaborării planului a constituit-o consultarea și implicarea factorilor interesați, prin realizarea a două întâlniri publice, conform cerințelor legislației în vigoare și a prevederilor contractuale din proiect;

6) după finalizarea Planului de management, acest document a parcurs etapele procedurii de mediu, conform legislației în vigoare.

Având în vedere existența unei suprapunerii a ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei cu o altă arie protejată de interes comunitar - ROSCI0329 Oltul Superior, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv [art. 21](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare, este necesară corelarea măsurilor celor două planuri astfel încât să fie respectată categoria cea mai restrictivă de management. ROSCI0329 Oltul Superior nu are un Plan de management aprobat în momentul elaborării acestui Plan de management, astfel încât pentru elaborarea acestui document va fi necesară corelarea cu prevederile planului de management al ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura și respectarea celor mai restrictive măsuri.

1.5. Istoricul revizuirilor și modificărilor Planului de management

O primă formă a Planului de management pentru aria naturală protejată a fost elaborată de custozii acesteia în anul 2010. Acest document a urmat anumite etape de verificare din partea autorităților de mediu la nivel regional - fosta Agenție Regională pentru Protecția Mediului Sibiu.

Așadar, nu există actualmente un Plan de management aprobat pentru acest sit.

Conform legislației în vigoare, custozii ariei protejate au elaborat în anul 2010 proiectul regulamentului sitului. Acest document a urmat etapele legale prin implicarea și consultarea factorilor interesați, inclusiv de verificare la nivelul ministerelor interesate și a fost până în prezent avizat favorabil de Direcția Biodiversitate a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice sub forma "Măsurilor de conservare în Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei" prin adresa nr. 182253/AF/09.08.2011.

Prezentul Plan de management s-a elaborat în cadrul proiectului realizat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, "Managementul durabil al ariilor protejate Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, Pădurea Bogății și Pădurea Bogata" - SMIS-CSNR 43047, denumit în continuare în planul de management „proiectul POS Mediu”.

1.6. Procedura de modificare și actualizare a Planului de management

Modificarea și actualizarea Planului de management se va face conform reglementărilor legale în domeniu. Acesta poate fi modificat și actualizat conform aceleiași legislații, fiind un document flexibil și adaptabil.

Conform legislației actuale, Planul de management se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, iar după finalizarea perioadei de valabilitate se revizuieste printr-o procedură similară cu procedura de realizare a sa. Varianta revizuită a Planului de management se va aviza și aproba conform legislației în vigoare.

1.7. Procedura de implementare a Planului de management

Responsabilitatea implementării Planului de management revine custozilor și partenerilor acestora, însă aplicarea măsurilor sale este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități sau au interese pe suprafața ariei naturale protejate, conform legislației în vigoare. Organizarea activităților se va realiza de către custozii și parteneri, în colaborare permanentă cu factorii de interes. Responsabilitatea implementării fiecărei acțiuni/măsurii de management aparține custodelui iar principalii partenerii cu care custodele poate colabora sunt specificați în capitolul privind planul de acțiuni.

Prevederile Planului de management, în conformitate cu legislația în vigoare, sunt integrate în alte planuri, precum cele de amenajare a teritoriului, de dezvoltare locală sau națională., amenajamente silvice, care vor fi armonizate de către autoritățile responsabile.

2. DESCRIEREA ARIEI NATURALE PROTEJATE

2.1. Informații generale

2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate

ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei este situat în Depresiunea Bârsei, bazinul râului Olt, partea centrală a României - Transilvania. Are următoarele coordonate geografice: latitudine N 45°43'1", longitudine E 25°24'38", având o suprafață de 4536 ha.

Administrativ, aparține Regiunii 7 Centru. În județul Brașov aria protejată se află pe teritoriul localităților Dumbrăvița, Hălchiu, Codlea, Holbav, Feldioara, Măieruș și în județul Covasna pe teritoriul localităților Hăghig și Belin.

Hărți cu localizarea ariei naturale protejate sunt incluse în Anexa [nr. 3](#) la Planul de management.

2.1.2. Limitele ariei protejate

Conform Hotărârii Guvernului [nr. 1284/2007](#) privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare, suprafața ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei este de 4536,4 ha fiind compusă din trei arii diferite, denumite în continuare: Aria Dumbrăvița, Aria Rotbav și Aria Măgura Codlei. Limitele sitului sunt prezentate în hărțile anexate la aceste acte normative. Aceste limite, în sistem STEREO 1970, se pun la dispoziția celor interesați în format electronic pe pagina de internet a autorității centrale pentru protecția mediului.

Scurtă descriere a limitelor ariei protejate

Aria Dumbrăvița: din colțul sud-vestic, spre cel nord-vestic, limita se suprapune peste calea ferată Brașov-Sibiu, apoi peste malul stâng al pârâului Hamaradea - Homorodul Perșanilor, până la digul de protecție de la marginea intravilanului comunei Dumbrăvița, în continuare pe acest dig și pe o potecă până la drumul județean DJ112C. De aici, limita urmează acest drum, până la colțul sud-estic al gardului de proprietate al fermei de păsări, de unde urmează acest gard și apoi liziera vestică a pădurii Noului, înconjurând o parte din aceasta, apoi lizeira estică a sa, coboară până în drumul județean DJ112C și urmează acest drum până la limita intravilanului localității Satu Nou. De aici, limita coboară direct până la malul drept al pârâului Hamaradea, urmează acest mal spre amonte, până la colțul nord-estic al heleșteului nr. 12 aparținând fermei piscicole Doripesco. De aici, limita coboară spre sud-vest, inițial pe digul acestui heleșteu, apoi pe un canal de desecare de pe terenurile agricole denumite la Grind și Prestură, până la colțul nord-vestic al fermei avicole Galli-Gallo.

Aria Rotbav: din colțul nord-vestic, spre colțul nord-estic, limita urmează drumul județean DJ103G, apoi spre sud limite între parcele agricole, paralel cu drumul județean DJ103E, malul drept al râului Olt, până în colțul sud-estic, de unde limita traversează Oltul perpendicular, până la colțul sud-vestic al bălții nr. 1 Rotbav. De aici spre nord, limita urmează malurile vestice ale bălților nr. 1, 2, 3, 4 Rotbav, apoi un canal de desecare paralel cu calea ferată Brașov-Sighișoara și această cale ferată până la colțul nord-vestic al ariei.

Aria Măgura Coldei: din colțul nord-estic, limita pleacă de la intersecția dintre drumul național DN1 și drumul comunal DC63, urmând acest drum comunal până la clădirile ștrandului Codlea, apoi urmează malurile stângi ale celor două lacuri, pârâul Holboșel - Auriu până în dreptul fermei de pui, apoi drumul forestier paralel cu valea Gardului până la intersecția cu drumul forestier Geamăna. De aici spre amonte, limita urmează acest drum forestier și valea până la obârșie, respectiv poiana Holbav. De aici limita se continuă pe un drum de pământ, până la poiana Gaura Ursului, punctul cel mai sudic. De aici spre nord-est, limita urmează drumuri de exploatare forestieră până în zona Maial, unde merge pe limita intravilanului construit al Municipiului Codlea - partea nordică, apoi urmează drumul național DN1 până în colțul nord-estic.

Hărți cu limitele ariei naturale protejate sunt incluse în Anexa nr. 4 la Planul de management.

2.1.3. Zonarea internă a ariei naturale protejate

În cadrul proiectului de regulament al sitului, realizat în anul 2010 de către custode, s-a considerat a fi necesară stabilirea unei zonări interne, având în vedere:

- a)** suprafața relativ mare a sitului;
- b)** necesitatea conservării unor habitate importante pentru speciile de păsări de interes comunitar, ca zone de cuibărit, hrănire, staționare, înnoptare, năpârlire;
- c)** interesele socio-economice ale unităților administrativ teritoriale sau ale altor factori de interes.

Au fost descrise două tipuri de zone: Zone de Protecție și Zone de Dezvoltare Sustenabilă. Detalierea zonării interne a sitului este descrisă la capitolul privind regulamentul/măsurile de conservare.

Zonarea internă a ariei naturale protejate este prezentată în Anexa nr. 2 la Planul de management iar hărțile în care se evidențiază zonarea internă sunt prezentate în Anexa nr. 14 la Planul de management.

2.1.4. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate

Trei tipuri diferite de arii protejate, de importanță locală - Lacul și heleșteul nr. 10 Dumbrăvița, națională - ariile naturale protejate Complexul Piscicol Dumbrăvița și Rotbav și internațională - Complexul piscicol Dumbrăvița sunt integral incluse în sit.

Reglementările privind declararea acestora s-au enumerat la capitolul 1.3. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, măsurile de management pentru ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei se aplică și pentru celelalte arii protejate incluse în acest sit.

O suprapunere parțială există cu situl Natura 2000 ROSCI 0329 Oltul Superior.

Harta suprapunerii ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei cu alte arii naturale protejate este inclusă în Anexa nr. 4 la Planul de management.

2.2. Mediul abiotic

2.2.1. Relief și geomorfologie

Situl este localizat în Depresiunea Bârsei - culoarul Vlădeni și culoarul Măieruș, respectiv Munții Perșani - partea sudică - aria Măgura Codlei, ca parte componentă a marelui complex depresionar intramontan de la curbura internă a Carpaților, cunoscut sub denumirea de Depresiunea Brașovului. Altitudinea este cuprinsă între 470 și 1298 m. Situl este o succesiune de terenuri plane și ușor denivelate, dar cuprinde și dealuri, respectiv munți joși - Măgura Codlei.

Harta geomorfologică este inclusă în Anexa nr. 5 la Planul de management.

2.2.2. Geologie

Geologic, situl are origine relativ complexă, apărând depozite sedimentare ale flișului cretacic și formațiuni vulcanice. Face parte din unitatea de orogen carpatic, subunitatea depresiunilor intramontane. Apar pe suprafețe întinse formațiuni aluviale, datând din Cuaternar - mai ales în lunca Oltului. În Culoarul Măieruș sunt prezente și formațiuni geologice ce datează din Pliocen.

Harta geologică este inclusă în este inclusă în Anexa nr. 6 la Planul de management.

2.2.3. Hidrologie

Sub raport hidrografic, situl se încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului. Câmpul depresionar joacă rolul de centru de colectare al tuturor râurilor din jur. Densitatea rețelei hidrografice scade din munți până în șesul depresionar, ajungând aici la 0,6-0,7 km/km². Cel mai important afluent

al Oltului din sit este Homorodul Perșanilor/Hamaradia, cu un bazin ce totalizează o suprafață de 322 km² și un curs cu o lungime de 35 km. Apele stătătoare sau semi-stătătoare sunt reprezentate de lacuri de baraj, iazuri, heleșteie piscicole și brațe moarte ale Oltului.

Harta hidrologică este inclusă în Anexa [nr. 7](#) la Planul de management.

2.2.4. Clima

Din punct de vedere zonal, clima se încadrează în climatul temperat, fiind un climat continental - moderat, respectiv un etaj climatic premontan, cu dese inversiuni termice iarna în câmpul depresionar. Temperatura medie anuală este de 7,6° C. Precipitațiile medii anuale însumează 592 mm. Durata medie a stratului de zăpadă este de 130 zile. Mișcările de aer care domină au direcția nord-est către sud-vest, dar în zona Dumbrăvița - Hălchiu predomină vânturile pe direcție vest-est.

2.2.5. Soluri/subsoluri

Din punct de vedere pedologic, în sit se întâlnesc următoarele clase și tipuri de sol: cernisoluri - cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale; luvisoluri - brun argiloiluvial, brun luvic; hidrisoluri - gleisol, limnisol; protisoluri - aluvisol. Cele mai mari suprafețe sunt ocupate de cernisoluri și luvisoluri. În zonele cele mai joase, apar solurile cu procent ridicat de apă, neevolute sau parțial evolute, de tipul aluvisolului și hidrisolurilor.

Harta pedologică este inclusă în Anexa [nr. 8](#) la Planul de management.

2.3. Mediul biotic

2.3.1. Ecosisteme

Trei tipuri principale de ecosisteme acoperă suprafața sitului: ecosisteme acvatic, ecosisteme forestiere și ecosisteme de terenuri deschise - agro-ecosisteme. Descrierea lor a fost realizată la capitolul 1.2. Descrierea ariei protejate.

2.3.2. Habitate

2.3.2.1. Habitate Natura 2000

Habitatele de interes comunitar, incluse în [Anexa I](#) a Directivei [92/43/CEE](#) și în Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

Aria protejată ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei a fost desemnată pentru conservarea speciilor de păsări de interes național/comunitar.

Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenței acestora pe teritoriul sitului.

2.3.2.2. Habitate după clasificarea națională

Două dintre cele trei arii ale sitului - Dumbrăvița și Rotbav sunt caracterizate de terenuri deschise și zone umede.

Pajiștile și buruienișurile sunt reprezentate, în principal prin tipurile de habitate: R3707 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu *Telekia speciosa* și *Petasites hybridus*; R3709 Comunități danubiene cu *Juncus effusus*, *Juncus inflexus* și *Agrostis canina*; R3714 Comunități daco-getice cu

Filipendula ulmaria, Geranium palustre și Chaerophyllum hirsutum; R3713 Pajiști antropice de Juncus tenuis și Trifolium repens; R3802 Pajiști daco-getice de Arrhenatherum elatius; R3803 Pajiști sud-est carpatice de Agrostis capillaris și Festuca rubra.

Habitatele acvatice și palustre sunt reprezentate prin tipurile de habitate: R5309 Comunități danubiene cu Phragmites australis și Schoenoplectus lacustris; R5305 Comunități danubiene cu Typha angustifolia și Typha latifolia; R5310 Comunități daco-danubiene cu Carex elata, Carex rostrata, Carex riparia și Carex acutiformis; R2206 Comunități danubiene cu Potamogeton perfoliatus, Potamogeton gramineus, Potamogeton lucens, Elodea canadensis și Najas marina; R2210 Comunități danubiene cu Bolboschoenus maritimus și Schoenoplectus tabernaemontani și altele asemenea.

Pădurile sunt răspândite în procent de peste 90% din suprafața ariei Măgura Codlei și sub 25% din aria Dumbrăvița lipsind din aria Rotbav.

Dintre tipurile de habitate de pădure, în teren au fost identificate, în principal: R4402 Păduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum; R4118 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera; R4119 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa; R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia; R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa; R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum; R4127 Păduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium dens-canis.

2.3.3. Flora de interes conservativ

2.3.3.1. Plante inferioare

Plantele inferioare de interes comunitar, incluse în [Anexa II](#) a Directivei 92/43/CEE și în Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenței acestora pe teritoriul sitului.

2.3.3.2. Plante superioare

Plantele superioare de interes comunitar, incluse în [Anexa II](#) Directivei 92/43/CEE și în Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenței acestora pe teritoriul sitului.

2.3.4. Fauna de interes conservativ

2.3.4.1. Nevertebrate

Speciile de nevertebrate de interes comunitar, incluse în [Anexa II](#) a Directivei 92/43/CEE și în Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și

completările ulterioare, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

2.3.4.2. Ihtiofaună

Speciile de pești incluse în [Anexa II](#) a Directivei 92/43/CEE și în Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

În formularul standard al ROSCI0329 Oltul Superior, cu care există suprapuneri - bazinele râului Olt și a Homorodului Perșanilor, figurează 10 specii de pești de interes comunitar. Până în prezent pe suprafața suprapusă a celor două situri au fost cu certitudine identificate speciile: *Rhodeus sericeus amarus* - bălțile Rotbav, lacul de acumulare Dumbrăvița, *Barbus meridionalis* - râul Olt.

2.3.4.3. Herpetofaună

Speciile de amfibieni și reptile incluse în [Anexa II](#) a Directivei 92/43/ și în Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

Dintre amfibieni a fost identificată specia *Bombina variegata*.

Sigura specie de reptilă de interes comunitar identificată în sit este *Emys orbicularis*, prezență rară sau accidentală în zonele umede ale ariilor Rotbav și Dumbrăvița.

2.3.4.4. Avifaună

Aria naturală protejată a fost desemnată pentru conservarea a 57 de specii de păsări de interes comunitar, incluse în [Anexa I](#) din Directiva [2009/147/CE](#). În formularul standard al ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei din Hotărârea Guvernului [nr. 1284/2007](#), cu modificările și completările ulterioare, sunt menționate speciile: *Aegolius funereus*, *Aquila pomarina*, *Ardea purpurea*, *Botaurus stellaris*, *Branta ruficollis*, *Bubo bubo*, *Chlidonias hybridus*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Gelochelidon nilotica*, *Grus grus*, *Haliaeetus albicilla*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Larus melanocephalus*, *Larus minutus*, *Mergus albellus*, *Milvus migrans*, *Nycticorax nycticorax*, *Pandion haliaetus*, *Pelecanus onocrotalus*, *Pernis apivorus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Philomachus pugnax*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Porzana porzana*, *Porzana pusilla*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna caspia*, *Sterna hirundo*, *Strix uralensis*, *Tringa glareola*, *Porzana parva*, *Crex crex*, *Asio flammeus*, *Circus aeruginosus*, *Alcedo atthis*, *Aythya nyroca*, *Chlidonias niger*, *Egretta alba*, *Picus canus*, *Dendrocopos medius*, *Dendrocopos leucotos*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Sylvia nisoria*, *Ficedula albicollis*, *Ficedula parva*.

Dintre acestea, un număr de 15 specii nu au fost identificate în teren în ultimii 10 ani, conform datelor custodelui, fie datorită statutului lor fenologic de specii accidentale în zonă, fie datorită faptului că habitatele din aria naturală protejată nu le sunt caracteristice: *Aegolius funereus*, *Falco columbarius*,

Gelochelidon nilotica, *Grus grus*, *Larus melanocephalus*, *Milvus migrans*, *Pelecanus onocrotalus*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Porzana pusilla*, *Sterna albifrons*, *Sterna caspia*, *Asio flammeus*, *Lanius minor*. În plus, au fost identificate două specii de interes comunitar, respectiv eretele vânăt - *Circus cyaneus* și stârcul galben - *Ardeola ralloides* care nu figurează în formularul standard.

Importanța sitului se datorează în primul rând speciilor și populațiilor de păsări sălbatice, îndeosebi a celor pentru care acesta a fost declarat. Astfel, dintre speciile cuibăritoare "țintă", fac parte: *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Microcarbo pygmeus* - singurul loc de cuibărit al speciei din Transilvania este la heleșteiele Dumbrăvița, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea* - populația sa cuibăritoare reprezintă peste 1% din populația minimă clocitoare la nivel național, situl încadrându-se între cele mai importante 20 situri ale speciei din România, *Aythya nyroca*, *Circus aeruginosus* - populația sa cuibăritoare reprezintă peste 2% din populația minimă clocitoare a României, fiind una din zonele umede cu cele mai mari densități de perechi clocitoare din interiorul lanțului carpatic și în primele 10 situri din țară, *Crex crex* - unele concentrări ale perechilor cuibăritoare apar anual în zona fânețelor de pe malul vestic al lacului de acumulare Dumbrăvița, *Porzana porzana*, *Porzana parva*. Dintre speciile de pasaj incluse în [Anexa I](#) din Directiva 2009/147/CE, sunt prezente în sit anual, în număr apreciabil, speciile: *Egretta alba* - peste 250 exemplare în perioada de toamnă, cifra reprezentând peste 1% din populația central- europeană care trece prin această zonă; *Ciconia nigra* - peste 30-70 indivizi poposesc aici în perioada septembrie-octombrie, cifra reprezentând peste 1% din populația central - europeană care trece în migrație spre sudul Europei. De asemenea, există și alte specii de păsări care se opresc aici, cu populații mari pentru interiorul lanțului carpatic, cele mai mari sau printre cifrele maxime înregistrate vreodată în Transilvania, precum: *Gavia arctica* - maxim 30 exemplare, *Anser albifrons* - maxim 1000 exemplare, *Tadorna tadorna* - maxim 75 exemplare, *Chlidonias niger* - maxim 500 exemplare. În perioadele de migrație, populația totală a păsărilor acvatice depășește 20000 de exemplare, fiind astfel îndeplinit criteriul numărul 5 pentru desemnarea Siturilor Ramsar - Situl Natura 2000 include singurul Sit Ramsar din Regiunea 7 Centru la nivelul anului 2014. Din punct de vedere al migrației este un punct de maximă concentrare pentru păsările acvatice, ce devine punct obligat de staționare și hrănire pentru o mare parte a populațiilor ce traversează Carpații spre și dinspre locurile de cuibărit ale Europei, conform formularului standard al sitului. Cu efective relativ mari pentru centrul țării în perioada migrației de toamnă poposește și răpitorul *Circus cyaneus*. Acesta formează concentrări de înnoptare în habitatele de rogozuri de pe unul din heleșteiele de la Dumbrăvița, singurul loc actual de înnoptare al speciei cunoscut în centrul țării.

Principalele habitate care prezintă o mare importanță pentru speciile de păsări enumerate, sunt: stufărișul inundat, păpurișul - asociații vegetale unde predomină specii de *Typha*, mlaștinile cu specii de *Carex*, fânețele umede și alte suprafețe de asociații vegetale inundate temporar, porțiunile cu apă mică

și nămolul apărut după vidarea parțială sau totală a heleșteielor, frecventate îndeosebi în pasaj de numeroase specii de păsări, ca: stârci, egrete, berze negre, limicole/păsări de țarm, pescăruși. În acest fel, managementul piscicol în care este cuprinsă acțiunea de vidare a heleșteielor pentru recoltarea peștilor toamna și uneori primăvara și vara, reprezintă o practică esențială pentru atragerea și menținerea acestor populații de păsări.

Măgura Codlei, prin cele câteva sute de hectare de pădure naturală, matură și în unele parcele neparcursă cu lucrări silvice - păduri cu grad ridicat de naturalețe, reprezentată mai ales de făgete pluriene și mai puțin de cvercinee, reprezintă habitatul mai multor specii de păsări incluse în [Anexa I](#) din Directiva 2009/147/CE, unele cuibărind cu populații însemnate: *Strix uralensis*, *Dryocopus martius*, *Dendrocopos medius*, *Dendrocopos leucotos*, *Ficedula parva*, *Ficedula albicollis*. De asemenea, sunt importante stâncăriile din interiorul pădurii, unde cuibărește *Bubo bubo* și *Falco peregrinus*.

Situl a fost desemnat Arie de Importanță Avifaunistică - Important Bird Area de către Societatea Ornitologică Română, pe baza criteriilor cantitative în privința populațiilor speciilor de păsări, elaborate de BirdLife Internațional.

Descrierea speciilor de păsări de interes comunitar

Se descriu toate speciile de păsări de interes comunitar identificate pe teritoriul sitului, prin proiectul POS și din baza de date a custodelui din ultimii 10 ani, în tabelul nr. 1. La fiecare specie descrierea este tipizată sub formă tabelară. Speciile care nu au fost identificate prin proiect și în ultimii 10 ani, nu au fost luate în considerare.

Tabelul nr. 1
Prezentarea speciilor de păsări de interes comunitar din ROSPA0037
Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei

Număr curent	Informație/atribut	Descriere
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A001 <i>Gavia stellata</i>
2	Denumirea populară	Fundacul mic
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre de apă de mărimea unei rațe - 57 cm, cu formă tipică de specie înotătoare, gât lung, cioc conic relativ lung și puțin curbat în sus spre vârf, corpul fusiform. În penaj de vară coloritul este cenușiu pe spate, cenușiu deschis pe cap și pe laturile gâtului, albicios pe abdomen. Caracteristic, are o pată roșcată pe gușă și striații alb cu negru pe ceafă. Iarna coloritul este mai uniform, brun pe partea dorsală cu numeroase pete mici albe. Înoată și se scufunda foarte bine. Nu se reproduce în România, fiind la noi doar specie de pasaj și oaspete de iarnă.
4	Habitat	Lacuri diverse, în migrație inclusiv pe heleșteie piscicole.
5	Distribuția în România	Apare în migrație și iarna pe diverse lacuri și pe mare, mai ales în sud-est și mai rar în centru.

6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia aparține tipului fenologic de pasaj, apărând în sit toamna, dar uneori rămâne și anumite perioade din iarnă pe luciile neînghețate și primăvara în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav, mai ales heleșteiele și lacurile, dar și Oltul.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	3-5 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște populația națională, fiind specie de pasaj.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A002 Gavia arctica
2	Denumirea populară	Fundacul polar
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre acvatică, cu aceeași alură cu cea a fundacului mic, dar ceva mai mare - 65 cm, cu formă tipică de specie înotătoare, gât lung, cioc conic relativ lung, corpul fusiform. Coloritul în penaj de vară este cenușiu pe cap, negru cu pete mici albe pe spate, alb pe abdomen. Iarna este pe partea dorsală brun uniform și albicios pe cea ventrală. Are același mod de viață cu cel al fundacului mic. Nu se reproduce în România, fiind la noi doar specie de pasaj și oaspete de iarnă.
4	Habitat	Lacuri diverse, în migrație inclusiv pe heleșteie piscicole.
5	Distribuția în România	Apare în migrație și iarna pe diverse lacuri și pe mare, mai ales în sud-est și mai rar în centru.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia aparține tipului fenologic de pasaj, apărând în sit toamna, dar uneori rămâne și anumite perioade din iarnă pe luciile neînghețate și primăvara în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav, mai ales heleșteiele și lacurile, dar și Oltul.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	8-10 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște populația națională, fiind specie de pasaj.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A393 Phalacrocorax pygmeus
2	Denumirea populară	Cormoranul mic

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre acvatică de talie medie - 50 cm, cu o alură caracteristică cormoranilor, ciocul conic, ușor încovoiat în jos la vârf, gâtul și coada relativ lungi. Adultul în penajul nupțial este negricios cu capul brun, iarna gușa devine albicioasă. Exemplarele tinere au partea inferioară albicioasă. Înoată foarte bine și se scufundă, iar pentru a-și usca penajul stau pe o cracă cu aripile desfăcute. Se reproduce în colonii, de regulă mixte, alături de diverse specii de stârci și egrete. Cuibărește mai ales în Delta Dunării, sudul, estul și vestul țării. Cuiburile sunt construite de regulă pe arbori din apă - sălcii, răchite.
4	Habitat	Zone umede diverse, precum: lacuri diverse, mlaștini, delte, heleșteie.
5	Distribuția în România	Are o distribuție legată de zonele umede cu habitate caracteristice, îndeosebi în zonele joase din sud-est și vest, respectiv în lunca și Delta Dunării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia aparține tipului fenologic "nerezidentă cuibăritoare", apărând în sit primăvara - aprilie, cuibărind pe două heleșteie de la Dumbrăvița și apoi toamna - octombrie- noiembrie părăsind zona spre sud. Atât habitatul de amplasare a cuiburilor, cât și habitatul de hrănire/odihnă/uscarea a penelor, este încadrat în limitele zonei umede a sitului. Așadar, la Dumbrăvița specia are ca distribuție întreaga zonă umedă.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	6-8 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,05-0,06 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A021 Botaurus stellaris
2	Denumirea populară	Buhaiul de baltă
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre de baltă medie - 75 cm, cu o alură caracteristică: ciocul relativ lung și conic, gâtul gros, aripile late și picioarele lungi. Coloritul este uniform brun cu pete negricioase pe spate și aripi, calota neagră ca și mustața. Picioarele sunt verzui, iar ciocul gălbui. Cântecul teritorial al masculului este foarte caracteristic și se aude din întinderea de stuf, fiind asemănător cu sunetul produs de un buhai. Poate sta nemișcat în stuf, cu gâtul întins. Cuibărește solitar în stufărișurile compacte ce nu au fost arse sau recoltate. Cuiburile sunt construite în masa de vegetație, deasupra apei.
4	Habitat	Preferă zone umede bogate în vegetație emersă - mai ales stuf, precum: lacuri, mlaștini, delte, heleșteie, canale invadate de vegetație. Se poate hrăni și pe habitate uscate, precum pășunile.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă în România, legată de habitatul preferat. Este mai răspândit în Delta Dunării, sudul și estul țării, dar se reproduce în mai multe zone umede și din vestul și centrul țării.

6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia este cuibăritoare, apărând în sit primăvara - martie-aprilie, cuibărind în unii ani pe 1-2 heleșteie de la Dumbrăvița/Rotbav și părăsind aria toamna - octombrie-noiembrie. În ultimii 5 ani a fost rar observată, fiind incert cuibăritoare, însă conform inventarierilor din proiect specia probabil a cuibărit prin 2 perechi, câte una în fiecare din cele două zone umede - Dumbrăvița, Rotbav.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	0-2 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,0-0,001 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A022 Ixobrychus minutus
2	Denumirea populară	Stârcul pitic
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este cel mai mic stârc de la noi, având lungimea totală de doar 35 cm. Alura este caracteristică stârcilor, având gâtul relativ lung și gros, ciocul conic și lung, picioarele lungi. Masculul adult este gălbui pe abdomen, gât și parțial pe aripă și negru în rest. Femela și juvenilul au un colorit mai șters, pătat. Picioarele sunt verzui, iar ciocul gălbui. Stă adesea nemișcat pe firele de stuf, fiind greu de observat. Cântecul teritorial al masculului este un "oor" repetat. Uneori strigă nazal: " che- che-che". Cuibărește solitar în vegetația emersă, uneori pe răchite mici, ce pot avea suprafețe destul de mici - câteva sute de metri pătrați. Cuiburile sunt construite în masa de vegetație, deasupra apei.
4	Habitat	Preferă zone umede chiar de dimensiuni mici, bogate în vegetație emersă, precum: lacuri, mlaștini, delte, heleșteie, iazuri, canale.
5	Distribuția în România	Are o distribuție largă în țară, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândit și mai abundent în Delta Dunării, sudul și estul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit primăvara - aprilie-mai, cuibărind pe toate bazinele cu vegetație, inclusiv pe coatele moarte ale Oltului și pe canalele cu stuf, atât la Dumbrăvița cât și la Rotbav și părăsind aria toamna - septembrie.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	50-70 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,005-0,007 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A023 Nycticorax nycticorax
2	Denumirea populară	Stârcul de noapte

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre acvatică de talie medie - 60 cm, cu corpul relativ voluminos, gâtul gros, ciocul conic și picioarele relativ lungi. Adultul în penajul nupțial este caracteristic: cenușiu deschis pe aripi și coadă, albicios pe gât și abdomen, negru pe creștet și spate. Prezintă și două pene lungi pe cap. Picioarele sunt gălbui. Exemplarele tinere sunt brune uniforme, cu numeroase striuri și pete albicioase. Este activ mai ales seara, iar strigătul este un "cuac" scurt. Se reproduce în colonii, de regulă mixte, alături de alte specii de stârci, egrete și cormorani mici. Cuibărește mai ales în Delta Dunării, sudul, estul și vestul țării. Cuiburile sunt construite de regulă pe arbori din apă - sălcii, răchite, mai rar pe stuf.
4	Habitat	Zone umede diverse, precum: lacuri diverse, mlaștini, delte, heleșteie.
5	Distribuția în România	Are o distribuție legată de zonele umede cu habitate caracteristice, îndeosebi în zonele joase din sud-est și vest, respectiv în lunca și Delta Dunării, dar câteva colonii se găsesc și în partea centrală - Transilvania.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit primăvara - aprilie, cuibărind pe două heleșteie de la Dumbrăvița și apoi toamna - septembrie-octombrie părăsind zona spre sud. Atât habitatul de amplasare a cuiburilor, cât și habitatul de hrănire/odihnă, este încadrat în limitele zonei umede a sitului. Așadar, la Dumbrăvița specia are ca distribuție întreaga zonă umedă. Colonia de cuibărit în care participă și specia, este una din puținele la nivelul interiorului lanțului carpatic - Transilvania.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	15-20 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,2-0,3 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A024 Ardeola ralloides
2	Denumirea populară	Stârcul galben
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este un stârc de talie medie - 45 cm, asemănător cu o egretă, dar având corpul mai gros, la fel și gâtul. Ciocul este conic, relativ lung, picioarele lungi. Adultul în penajul nupțial este alb, cu spatele și gâtul gălbui și un smoc de pene pe cap. Coloritul ciocului este albăstrui la baza și mai închis spre vârf, picioarele fiind verzi. Exemplarele tinere au părțile gălbui de la adult, de culoare brună. Se reproduce în colonii, de regulă mixte, alături de alte specii de stârci, egrete și cormorani mici. Cuibărește mai ales în Delta Dunării, sudul, estul și vestul țării. Cuiburile sunt construite de regulă pe arbori din apă - sălcii, răchite, mai rar pe stuf.
4	Habitat	Zone umede diverse, precum: lacuri diverse, mlaștini, delte, heleșteie.
5	Distribuția în România	Are o distribuție legată de zonele umede cu habitate caracteristice, îndeosebi în zonele joase din sud-est și vest, respectiv în lunca și Delta Dunării.

6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit primăvara - aprilie-mai, cuibărind pe două heleșteie de la Dumbrăvița și apoi toamna - august-septembrie părăsind zona spre sud. Atât habitatul de amplasare a cuiburilor, cât și habitatul de hrănire/odihnă /uscare a penelor este încadrat în limitele zonei umede a sitului. Așadar, la Dumbrăvița specia are ca distribuție întreaga zonă umedă. În prezent, perechile clocitoare de la Dumbrăvița sunt probabil singurele din Transilvania.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	2-3 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,03-0,04 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A029 Ardea purpurea
2	Denumirea populară	Stârcul roșu
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este un stârc de talie mare, cu lungimea totală de 85 cm. Alura este caracteristică stârcilor, cu gâtul lung și subțire, ciocul conic și lung, picioarele lungi. În zbor, ține gâtul strâns în formă de "S". Adultul are un colorit general brun-roșcat, cu gâtul mai deschis și cu câteva striuri longitudinale negricioase. Creștetul este negru, având câteva pene mai lungi. Picioarele sunt gălbui. Juvenilul este mai brun uniform, fără striuri. Scoate diverse sunete, precum un "chooo" răgușit la cuib. Cuibărește solitar sau în mici colonii în vegetația emersă - mai ales în stufărișuri compacte. Cuiburile sunt construite în masa de vegetație, deasupra apei.
4	Habitat	Preferă zone umede diverse, bogate în vegetație emersă, precum: lacuri, mlaștini, delte, heleșteie, iazuri, canale. Hrănirea se poate face și pe habitate uscate, precum: pajiști, terenuri cultivate recoltate.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândit și mai abundent în Delta Dunării, sudul și estul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit primăvara - aprilie-mai, cuibărind pe 4-5 bazine din cele două arii cu zone umede - Dumbrăvița și Rotbav și părăsind situl toamna - august-septembrie. Peste 90% din cuiburi sunt construite în stufăriș - Phragmites australis, restul în păpuriș - Typha angustifolia. Nu necesită suprafețe foarte compacte de stuf, uneori cuiburile fiind amplasate pe peninsule de stuf de sub 1 ha. Întotdeauna are însă nevoie de un nivel al apei sub cuiburi de peste 20-30 cm. Cea mai mare populație cuibăritoare a speciei din Transilvania este în sit.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	10-20 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună

10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	1,1-2 %, > 1 %
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A027 Ardea alba
2	Denumirea populară	Egreta mare
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Specie de stârc de talie mare, practic cel mai mare de la noi, cu o lungime totală de 90 cm. Alura este caracteristică stârcilor, cu gâtul lung și subțire, ciocul conic și lung, picioarele lungi. În zbor, ține gâtul strâns în formă de "S". În toate penajele are un colorit alb. Picioarele sunt negricioase, iar ciocul în perioada de reproducere este gălbui cu baza neagră, iar în afara sezonului de cuibărit acesta devine galben în totalitate. Produce diverse sunete, mai cunoscute fiind cel emis de păsările speriate: "crr-crr. . ". Cuibărește solitar sau în mici colonii în vegetația emersă - mai ales în stufărișuri. Cuiburile sunt construite în masa de vegetație, deasupra apei, mai rar în răchite sau sălcii.
4	Habitat	Preferă zone umede diverse, bogate în vegetație emersă, precum: lacuri, mlaștini, delte, heleșteie, iazuri, canale. Hrănirea se face adesea și pe habitate uscate, precum: pajiști, terenuri cultivate recoltate.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândită și mai abundentă în Delta Dunării, sudul și estul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit primăvara - martie-aprilie, cuibărind pe 1-2 bazine din aria Dumbrăvița și părăsind situl toamna în octombrie-noiembrie. Cuibărește exclusive în stuf.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	1-2 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,1-0,2 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A027 Ardea alba
2	Denumirea populară	Egreta mare - populația de pasaj
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Descriere - realizată anterior
4	Habitat	Informația a fost prezentată anterior.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândită și mai abundentă în Delta Dunării, sudul și estul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit în migrația de primăvară - februarie/martie-aprilie și de toamnă - august-noiembrie/decembrie, în ambele arii cu zone umede, dar evident mai frecvent și abundent la Dumbrăvița. Este reprezentată de o importantă populație de pasaj în fiecare an, mai ales toamna aici hrănindu-se și înnopțând în răchite, papură și stuf zeci de exemplare, cu maxime zilnice de peste 180-200 indivizi în perioadele de vârf la Dumbrăvița.

7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	150-200 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A026 Egretta garzetta
2	Denumirea populară	Egreta mică
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Specie de stârc de talie medie, având lungimea totală de 60 cm. Alura este asemănătoare celorlalți stârci cu gâtul și picioarele lungi, coloritul fiind alb curat. Ciocul este negricios, iar picioarele negre cu degetele galbene. În perioada nupțială are două pene lungi pe creștet, ce coboară spre ceafă. În zbor, ține gâtul strâns în formă de "S". Scoate diverse sunete, precum un gălgâit și alte strigăte răgușite. Cuibărește colonial, cu alte specii de stârci sau cu cormoranul mic, în răchite și sălcii, mai rar în vegetația emersă.
4	Habitat	Se întâlnește în zone umede diverse, bogate în vegetație emersă, precum: lacuri, mlaștini, delte, heleșteie, iazuri, canale.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândită și mai abundentă în Delta Dunării, sudul și estul țării, dar apare în multe alte zone umede prilenice, mai ales în migrație.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit primăvara - aprilie, cuibărind pe 1-2 bazine din aria Dumbrăvița și părăsind situl toamna - septembrie-octombrie. Cuibărește în colonia mixtă de pe cele două heleșteie de la Dumbrăvița, aici fiind unul din puținele locuri de cuibărit ale speciei din Transilvania.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	5-7 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,12-0,14 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A031 Ciconia ciconia
2	Denumirea populară	Barza albă

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre de talie mare, caracteristic cu gâtul, ciocul și picioarele lungi, având o lungime totală de 100 cm. Ușor de recunoscut, cu un colorit alb, cu jumătate de aripă neagră - remigele. Ciocul și picioarele sunt roșii. În zbor, ține gâtul întins, zburând cu bătaii ample de aripi, urmate de planări, iar când are nevoie de curenți se rotește. Scoate diverse sunete, mai cunoscute fiind clămpăniturile de cioc. Cuibărește în localitățile rurale, mai rar la marginea pădurii sau pe diverse edificii din afara localităților. Cuibul este amplasat pe coșuri, acoperișuri, stâlpi.
4	Habitat	Preferă habitate de terenuri deschise - pășuni, fânețe, terenuri cultivate recoltate, zone umede diverse, precum: margini de lacuri, mlaștini, heleșteie, iazuri. Habitatul de reproducere este reprezentat de localitățile umane.
5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ mare în țară, mai ales în zonele de câmpie din sud și est și cele depresionare din Transilvania. În migrație traversează țara prin diverse culoare de zbor, preferând partea estică, dar multe stoluri trec prin văile munților din Transilvania în sud.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit mai ales toamna - august-septembrie în aria Dumbrăvița, pe terenurile deschise unde se hrănește și se odihnește. Cuibărește în localitățile limitrofe sitului.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	10-30 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A030 Ciconia nigra
2	Denumirea populară	Barza neagră
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre foarte asemănătoare berzei albe, ca structură, dar puțin mai mică - 105 cm. Adultul este negru, cu excepția abdomenului alb. Pe gât, spate și aripi are unele reflexe metalizate verzui sau violet. Ciocul și picioarele sunt roșii aprins. Pasărea tânără este mai brună, fără acele reflexe metalizate, iar ciocul și picioarele sunt verzui. Are același tip de zbor ca și barza albă. Scoate diverse sunete. Cuibărește în păduri mari, mature/bătrâne, mai ales de foioase dar și de amestec sau chiar de rășinoase. Cuibul este amplasat în arbori mari.
4	Habitat	Preferă diverse habitate de la păduri pentru reproducere, până la habitate de terenuri deschise - pășuni, fânețe și mai ales zone umede pentru hrănire, precum margini de lacuri, mlaștini, heleșteie, iazuri, pâraie.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă, în funcție de habitatele forestiere optime pentru cuibărit. Astfel, este mai des întâlnită în depresiunile din Transilvania și în zona deluroasă și în subcarpați. În migrație poposește adesea în zone umede prielnice, abundente în pește - iazuri, heleșteie.

6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia apare în sit mai ales toamna - august-septembrie, dar și primăvara - aprilie-mai. La heleșteiele de la Dumbrăvița se concentrează toamna zeci de exemplare în funcție de hrana accesibilă apărută prin vidarea bazinelor. Aici este cel mai mare număr de berze negre ce poposesc în migrație din Transilvania și unul din siturile cu cele mai mari concentrări de acest fel la nivel național.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	20-40 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A396 Branta ruficollis
2	Denumirea populară	Gâsca cu gât roșu
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este una din cele mai mici specii de gâscă sălbatică, având o lungime totală de 60 cm. Se caracterizează printr-un corp relativ mic și un cioc de asemenea mic. Coloritul este foarte frumos și nu poate fi confundată. Aripa, abdomenul, creștetul și ceafa sunt negre, gâtul, pieptul și obrazul cărămizii, flancurile și sub coada albă. Are o pata albă între cioc și ochi și un desen caracteristic în zona urechii. Zboară de regulă în stoluri împreună cu alte gâște. Nu se reproduce în România, fiind la noi doar specie de pasaj și oaspete de iarnă.
4	Habitat	În migrație preferă diverse zone umede pentru odihnă/înnoptare și culturi agricole - mai ales grâu și rapiță pentru hrănire.
5	Distribuția în România	Apare în migrație și iarna pe diverse lacuri și culturi, mai ales în Dobrogea și sud-estul țării
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna - noiembrie și primăvara - martie-aprilie în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei, culturi de grâu pentru hrănire. O întâlnim în stolurile de gărlită mare - Anser albifrons, mai ales pe heleșteiele și lacul de acumulare Dumbrăvița și pe culturile marginale bazinelor acvatice.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	2-5 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A060 Aythya nyroca
2	Denumirea populară	Rața roșie

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Specie de rață scufundătoare de talie medie, cu o lungime totală de 40 cm. Masculul este ruginiu-stacojiu, cu excepția abdomenului albicios și a unei pete albe vizibile sub coadă. Femela are un colorit mai brun. Ciocul este albastrui. În zbor se remarcă o bandă lăta albă pe aripa brună, ce contrastează evident. În zbor produce un cârâit scurt: " car". Cuibărește în vegetația emersă. Cuiburile sunt construite în masa de vegetație, deasupra apei.
4	Habitat	Preferă zone umede diverse, bogate în vegetație emersă și submersă, precum: lacuri, mlaștini, delte, heleșteie, iazuri, canale, ape curgătoare lene.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă în țară, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândită și mai abundentă în Delta Dunării, sudul, estul și vestul țării și mai rară în centru.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit primăvara - martie-aprilie, cuibărind pe unele bazinele cu vegetație abundentă, inclusiv submersă, atât la Dumbrăvița cât și la Rotbav și părăsind aria toamna - octombrie-noiembrie. Cele mai multe perechi cuibăresc la Rotbav, mai ales pe bălțile 2 și 3, precum și pe heleșteul 1. Perechi sau exemplare necuibăritoare apar și pe alte bazine.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	10-20 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,2-0,3 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A060 Aythya nyroca
2	Denumirea populară	Rața roșie - populație de pasaj
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Informația a fost prezentată anterior.
4	Habitat	Informația a fost prezentată anterior.
5	Distribuția în România	Informația a fost prezentată anterior.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit primăvara - martie-aprilie și toamna - august-noiembrie, mai ales pe bazinele acvatice cu vegetație submersă sau pe malul apelor curgătoare unde găsește alte surse trofice - lacul de acumulare Dumbrăvița, unele heleșteie, bălțile Rotbav, câteva sectoare ale râului Olt. Astfel, se pot concentra în grupuri de zeci de exemplare, formând zone relativ stabile de odihnă și năpârlire.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	100-150 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște mărimea populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea	A068 Mergus albellus

	științifică	
2	Denumirea populară	Fereastră mic
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Specie de rață de talie mică - 40 cm, adaptată scufundării. Pe apă are forma tipică de rață, cu ciocul mic. Masculul și femela se deosebesc evident la colorit. Astfel, masculul are un colorit tipic alb cu negru, cu excepția vârfului aripii brun-cenușiu. Capul este alb, cu o pată neagră de la ochi la cioc și alte dungii negre pe ceafă, spate, aripă. Femela se recunoaște după creștetul și ceafa maronii, cu obrazul alb, cu un contrast evident. Spatele este brun, flancurile cenușii deschise. Ciocul este cenușiu. Se scufundă des după pești mici și alte animale acvatice cu care se hrănește. Zborul este rapid. Nu se reproduce în România, fiind la noi doar specie de pasaj și oaspete de iarnă.
4	Habitat	Lacuri diverse, în migrație inclusiv pe heleșteie piscicole. Cuibărește în taiga, în scorburi din arbori.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă în țară, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândită și mai abundentă în Delta Dunării, sudul, estul și vestul țării și mai rară în centru.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna, dar uneori rămâne și anumite perioade din iarnă pe luciile neînghețate și primăvara în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav - mai ales heleșteiele și lacurile, dar și Oltul.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	5-10 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște mărimea populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A094 Pandion haliaetus
2	Denumirea populară	Uliganul pescar
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre răpitoare de zi de talie mare: 53-61 cm, tipică zonelor umede bogate în pești, de unde îi capturează prin observare - zbor staționar și apoi plonjare în apă. Coloritul este brun pe aripi și spate, alb pe abdomen și cap, cu o dungă brună de la cioc peste ochi, până la umăr. Sub aripă este alb cu brun. Juvenilul este mai pătat cu alb pe spate. Peștii capturați îi transportă în gheare, orientându-i cu fața spre înainte. Nu se reproduce în România, fiind la noi doar specie de pasaj.
4	Habitat	Zone umede întinse - lacuri diverse, în migrație inclusiv heleșteie piscicole, de unde poate pescui, iar pentru odihnă folosește luncile râurilor și alte zone cu arbori. Cuibărește în nordul continentului pe arbori din zonele umede.
5	Distribuția în România	Apare în migrație pe diverse lacuri interioare, de regulă prin exemplare solitare. Adesea capturează pești de pe heleșteie și iazuri piscicole.

6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna - septembrie-octombrie și primăvara - aprilie pe întreaga suprafață a lacurilor și apelor curgătoare unde vânează pești. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav, mai ales heleșteiele și lacurile.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	1-2 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște mărimea populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A075 Haliaetus albicilla
2	Denumirea populară	Uliganul pescar
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este una dintre cele mai mari păsări răpitoare de la noi, cu o lungime totală de 77-92 cm și o anvergură de până la 2,5 metri. Are o alură impozantă, cu un corp masiv, gât gros și un cioc foarte puternic. Adultul are penajul brun deschis pe spate și cap, având coada albă complet, iar ciocul galben. Exemplarele tinere, sunt mai închise, albul de pe coada lipsind sau apărând doar parțial. Bătăile de aripi sunt ample, uneori rotindu-se. Aripa este lată și penele răsfirate la vârf, iar coada pare rotunjită sau rombică. Cuibărește în Delta Dunării și câteva zone de luncă de pe Dunăre.
4	Habitat	Zone umede întinse - lacuri diverse, în migrație inclusiv heleșteie piscicole, de unde poate pescui, iar pentru odihnă folosește luncile râurilor și alte zone cu arbori. Cuibărește în centrul și nordul continentului, mai rar în țară - Delta Dunării și parțial lunca Dunării, pe arbori din zonele umede.
5	Distribuția în România	În migrație apar exemplare nordice, mai ales în sud, est și vest, mai rar în centru, pe diverse lacuri interioare, inclusiv pe heleșteie.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna - septembrie-decembrie, uneori putând rămâne și o parte din iarnă și primăvara - martie-aprilie pe întreaga suprafață a lacurilor și apelor curgătoare unde se hrănește cu diverse păsări sau consumă pești, cadavre. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav, mai ales heleșteiele și lacurile.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	1-2 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște mărimea populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A072 Pernis apivorus
2	Denumirea populară	Viesparul

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre răpitoare de zi cu o lungime totală de 51-58 cm. În zbor are aripile lungi, relativ late, coada de multe ori deschisă în formă de evantai și caracteristic, spre deosebire de șorecar cu care se poate confunda, gâtul este subțire și capul mic ce pare ușor turtit. Coloritul este în general cenușiu pe spate, albicios sub aripă, cu două pete maro și striuri de aceeași culoare, vârful cozii fiind terminat cu o dungă, de asemenea maro. Abdomenul este brăzdat de dungi transversale brune. Există și exemplare mai deschise sau mai închise. Bătăile de aripi sunt ample, de multe ori rotindu-se. Niciodată nu zboară pe loc. Sunetul produs adesea, este un fluierat: "pii- iu". Cuibărește în zonele de câmpie și colinare, mai frecvent în depresiuni.
4	Habitat	Preferă pădurile întinse sau trupurile de pădure intercalate cu terenuri deschise - pajiști, cuibărind în arbori.
5	Distribuția în România	Este una din speciile de răpitoare diurne relativ răspândite în țară. În migrație apar exemplare nordice, fie izolate, fie în grupuri.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna - august-septembrie și primăvara - aprilie-mai pe terenurile deschise, îndeosebi pe pajiștile din ariile Dumbrăvița și Rotbav.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	10-20 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște mărimea populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A089 Aquila pomarina
2	Denumirea populară	Acvila țipătoare mică - populație de pasaj
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre răpitoare de zi de talie mare - 57-64 cm. Are o alură tipică de răpitoare puternică, cu un corp relativ voluminos, gât gros și picioare puternice. În zbor, aripile au vârful răsfrat, de multe ori rotindu-se. Adultul are un penaj brun uniform, ceva mai gălbui pe partea dorsală a aripii. Juvenilul este maro, cu pete albe în șiruri, pe aripă. Cuibărește în zonele colinare și depresionare, dar și în zona piemonturilor montane.
4	Habitat	Preferă pădurile întinse sau trupurile de pădure intercalate cu terenuri deschise - pajiști, cuibărind în arbori, dar hrănindu-se preponderent pe terenurile deschise - pajiști, culturi.
5	Distribuția în România	Are o răspândire mai mare în Transilvania și în zona dealurilor carpatice. În migrație apar exemplare nordice, fie izolate, fie în grupuri.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna - august-septembrie și primăvara - aprilie-mai pe terenurile deschise, îndeosebi pe pajiștile din ariile Dumbrăvița și Rotbav.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	30-40 indivizi

9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște mărimea populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A082 Circus cyaneus
2	Denumirea populară	Eretele vânat
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este o pasăre răpitoare de talie medie - 45-52 cm. Ca și ceilalți ereți, are o formă caracteristică alungită a corpului și mai ales a aripilor și a cozii, îndeosebi în zbor părând o pasăre mai mare datorită formeii lungi a acestor părți ale corpului. Ca și la ceilalți ereți, diferența între mascul și femelă este evidentă după coloritul penajului. Astfel, masculul adult este caracteristic, cenușiu deschis, cu abdomenul albicios și vârful aripii negru, contrastând puternic cu restul penajului. Femela este brună relativ uniform, cu partea inferioară mai deschisă, brăzdată de striuri longitudinale. Se remarcă o pată albă vizibilă pe târtiță. Produce diverse sunete. Cuibărește în zonele deschise de nordul și parțial centrul Europei, nu și în țara noastră.
4	Habitat	Este o pasăre răpitoare de terenuri deschise - pajiști, fânețe, culturi agricole, ce cuibărește în zonele aflate la nordul României pe sol, în diferite tipuri de vegetație.
5	Distribuția în România	Apare în migrație, mai ales toamna, când se observă de regulă exemplare izolate, dar există și grupuri mici.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna - septembrie-noiembrie și primăvara - martie-aprilie pe terenurile deschise, îndeosebi pe pajiști și culturi din ariile Dumbrăvița și Rotbav. Este observat și iarna. Exemplarele identificate iarna sunt de fapt tot exemplare aflate în pasaj, ce trec prin zonă destul de rapid. Populațiile de pasaj sunt reprezentate de indivizi solitari sau grupuri de până la 4-5 exemplare, îndeosebi în stufărișuri, răchitișuri și rogozuri de pe heleșteie și lacuri, dar și pe arături, pajiști și terenuri abandonate.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	70-100 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu se cunoaște mărimea populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A081 Circus aeruginosus
2	Denumirea populară	Eretele de stuf

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este un erete ceva mai mare ca cel vânat, cu lungimea totală de 48-55 cm. Dimorfismul sexual este accentuat, masculul adult fiind brun-roșcat, cu aripa dorsal parțial brună, cenușie deschis și vârful acesteia negru, iar ventral cenușie cu vârful negru. Capul are un colorit brun-gălbui. Femela are un colorit brun uniform, cu creștetul și bărbia bej, contrastând cu restul penajului mai închis. Juvenilul seamănă cu femela, dar este mai închis și culorile bej-gălbui din zona capului sunt mai pronunțate și în contrast mai mare cu restul penajului. Ca și ceilalți ereți, zboară peste terenurile deschise sau stufăriș, cu bătaii de aripi, urmate de planări, iar când a detectat prada coboară brusc. Scoate diverse sunete, iar caracteristic este zborul nupțial al masculului, la mari înălțimi deasupra stufărișului, acesta coborând în picaj și cu strigăte fluierate, apoi urcând din nou o distanță mai mică decât coborârea, până aterizează rapid în stufăriș. Cuibărește în vegetație emersă, mai ales în stufărișuri compacte și mai rar pe diverse culturi. Cuiburile pot fi apropiate la zeci sau sute de metri, realizând aparent concentrări, în zonele bogate în hrana necesară.
4	Habitat	Este una din speciile de răpitoare de la noi cele mai apropiate de zonele umede, pentru cuibărit și hrănire folosind vegetația emersă, mai ales masa de stuf de pe lacuri, heleșteie, delte. Hrănirea se poate face și pe habitate uscate, precum: pajiști, terenuri cultivate.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândit și mai abundent în Delta Dunării, sudul, estul și vestul țării, dar și în zonele umede mai mari din centru. Pare că se extinde și devine tot mai abundent.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit primăvara - aprilie-mai, cuibărind pe 5-7 bazine din cele două arii cu zone umede - Dumbrăvița și Rotbav și părăsind situl toamna - septembrie-octombrie. Răspândirea sa ca specie cuibăritoare este legată de vegetație emersă, ocupând însă nu doar suprafețele mari și compacte de stuf, ci și unele insule de sub 200 metri pătrați. Legat de hrănire, preferă atât stufărișurile și în general zonele umede, cât și terenurile deschise unde capturează mai ales șoareci.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	12-20 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,7-0,8 %, > 1 %
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A103 Falco peregrinus
2	Denumirea populară	Șoimul călător

3	Descrierea speciei morfologie, biologie	Este unul din cei mai mari șoimi europeni, cu o lungime totală de 40-52 cm. Adultul este cenușiu-albăstrui pe spate, albicios pe partea inferioară, brăzdat de striuri transversale. Caracteristic, capul este negricios cu o mustață proeminentă. Picioarul și degetele sunt galbene. Juvenilul este brun pe spate, cu puncte longitudinale brune pe abdomenul albicios. Zborul este rapid, cu bății de aripi viguroase. Adesea vânează în picaj. Strigătul de alarmă este un "che-che". Cuibărește de regulă pe stâncării, fie izolate, fie sub formă de chei. Depunerea pondei are loc direct pe substrat.
4	Habitat	Pentru cuibărit preferă mai ales stâncăriile de tipul cheilor sau chiar cele izolate, de regulă din păduri. Vânează și pe teren deschis, precum pășiți, culturi, liziere, zone umede, dar și în localități. Habitatul din migrație este asemănător cu cel de procurare a hranei din timpul cuibăritului.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. După scăderea dramatică a populației naționale din anii 1970- 1980, în ultimii ani numărul perechilor clocitoare din România a cunoscut o creștere. Și în alte zone ale arealului său s-a observat o reocupare a vechilor teritorii de cuibărit.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Nu are un cuibărit regulat în sit. Există ani când nu s-a identificat și ani în care a cuibărit probabil sau cert. Singura zonă de reproducere din sit este reprezentată de stâncăriile de pe versantul vestic al Măgurii Codlei, și unele stânci de pe cel estic sau nordic. Au fost determinate câteva nișe de cuibărit pe stânci, cu vechime de cel puțin câteva zeci de ani.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	0-1 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0 - 0,7 %, > 1 %
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A119 Porzana porzana
2	Denumirea populară	Crestețul pătat
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre cu lungimea de 23 cm, având un corp robust, aripi și coada scurte, adesea coada ținută ușor în sus. Coloritul este brun pe spate, cu pete mici albicioase, partea inferioară albăstruie, de asemenea pătată, iar flancurile striate alb cu negru. Sub coadă este albicios. Picioarele sunt lungi, verzui. Frecventează mai ales vegetația de baltă, adesea pe frunzele plutitoare sau pe mâl, zburând pe distanțe mici, cu picioarele atârând. Cântecul teritorial al masculului este un "huit-huit" repetat, de la distanță seamănă cu zgomotul produs de căderea unei picături de apă. Cuibărește în vegetația de mlaștină. Cuiburile sunt construite în masa de vegetație, deasupra apei sau pe uscat.

4	Habitat	Preferă zone umede chiar de dimensiuni mici, bogate în vegetație de mlaștină, formată mai ales din specii de rogozuri - Carex. Populează și pajiști umede inundate temporar. Adâncimea apei în habitatele de reproducere nu depășește de regulă 20-25 cm. Apare la margini de lacuri, în mlaștini, delte, heleșteie, iazuri, canale.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Atât distribuția, cât și densitatea este foarte variabilă având în vedere diferențele de la un an la altul între suprafețele de zone umede. Este mai răspândită și mai abundentă în Delta Dunării, sudul și estul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit primăvara - aprilie-mai, cuibărind pe anumite lacuri și heleșteie cu vegetație, dar și în mlaștinile de pe canale, atât la Dumbrăvița cât și la Rotbav. Părăsește aria toamna, în septembrie-octombrie.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	10-20 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,12-0,13 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A120 Porzana parva
2	Denumirea populară	Crestețul cenușiu
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Asemănător creștețului pătat, este însă puțin mai mic - 19 cm. Coloritul masculului adult este brun pe spate, cenușiu-albăstrui pe partea inferioară, sub coadă striat negru cu alb. Caracteristic, la baza ciocului are o pată roșie. Femela este brună cu abdomenul bej deschis. Juvenilul seamănă cu femela, având flancurile mai brăzdate de dungi negricioase. Picioarele sunt verzui. Cântecul teritorial este un "cuc - cuc" repetat, ce spre final se accelerează și scade din putere. Produce și alte sunete. Cuibărește în vegetația emersă, cel mai adesea în stufăriș sau păpuriș. Cuiburile sunt construite în masa de vegetație, deasupra apei.
4	Habitat	Spre deosebire de creștețul pătat, habitatul său preferat este format din stufărișuri sau păpurișuri vechi, încălcite, aflate în apă mare, de peste 40-50 cm. Apare la margini de lacuri, în mlaștini, delte, heleșteie, iazuri, canale.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Poate să dispară în anumiți ani din zonele umede unde s-a ars stuful vechi sau a fost recoltat. Este mai răspândită și mai abundentă în Delta Dunării, sudul și estul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit primăvara - aprilie-mai, cuibărind pe anumite lacuri și heleșteie cu vegetație, dar și în mlaștinile de pe canale, atât la Dumbrăvița cât și la Rotbav și părăsind aria toamna - septembrie-octombrie.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	20-30 perechi

9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,3-0,4 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A122 Crex crex
2	Denumirea populară	Cristelul de câmp
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre de 26 cm. Are corpul robust, coada scurtă și picioarele relativ lungi. Ciocul este conic, scurt. Coloritul adultului este relativ uniform, brun pestriț pe spate, cenușiu- albăstrui pe piept, brun deschis cu dungi transversale pe abdomen. Aripa este parțial roșcată. Juvenilul are un colorit mai șters, dar se remarcă aripa roșcată. Zboară scurt, cu picioarele atârând. Cântecul teritorial al masculului se aude primăvara și vara, fiind un: "cre - cre" repetat, auzit mai ales seara și noaptea. Produce și alte sunete. Cuibărește în vegetația ierboasă, pe pământ.
4	Habitat	Este o pasăre tipică terenurilor deschise formate în principal din fânețe, preferabil umede, alte terenuri cu plante ierboase, mai rar culturi de grâu, lucernă.
5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ largă, în funcție de habitatele preferate - mai ales fânețe. Astfel, este mai răspândit în zonele depresionare, luncile apelor, suprafețele ierboase din zonele lacurilor. Cele mai mari densități le are în Transilvania, estul și vestul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit primăvara - aprilie-mai, cuibărind în câteva fânețe și culturi, mai ales la Dumbrăvița și părăsind aria toamna - august- septembrie. Zonele de cuibărit sunt legate îndeosebi de fânețele umede, dar și de cele uscate și mai rar de unele culturi. Dintre zonele tipice de cuibărit, fac parte: malul vestic al lacului de acumulare - Luncă, Livezi, zona dintre lac și iazuri - Plec, unele fânețe din zona Satu Nou și de pe Grind. La Rotbav cuibăresc câteva perechi în zona Arini și Vadu Roșu.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	20-30 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,04-0,05 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A131 Himantopus himantopus
2	Denumirea populară	Piciorongul
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre de 38 cm, cu o siluetă și un colorit caracteristic. Se deosebește ușor după picioarele foarte lungi, ciocul lung, drept și subțire, precum și după coloritul bicolor. Adultul este alb, cu negru pe aripă, uneori și pe cap. Picioarele sunt roz, iar ciocul negru. Juvenilul este mai brun în loc de negru, iar picioarele sunt mai șterse la culoare. Prezintă mai multe tipuri de strigăte, frecvent produce un "cli-cli". Cuibărește în zone deschise din preajma apelor, pe insule, mâl, nisip.

4	Habitat	Pentru hrănire și cuibărit preferă mlaștinile cu apă mică, mărul apelor, marginile de ape nămolose, terenurile sărăturoase.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă, atât ca specie cuibăritoare cât și în pasaj. Astfel, cuibărește în zone umede prielnice mai ales în sudul și estul țării, mai rar în rest. În migrație este mai frecventă și abundentă în aceleași zone, dar apare și în zonele cu măr, inclusiv pe heleșteiele piscicole din interiorul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit în mod neregulat, mai ales primăvara - aprilie-mai și toamna - august, însă exemplare izolate sunt observate și în perioada de vară - iunie-iulie, fără a cuibări.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	2-5 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A132 Recurvirostra avosetta
2	Denumirea populară	Ciocîntorsul
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre cu siluetă și colorit tipic, având o lungime totală de 43 cm. Caracteristic, are un cioc lung, curbat în sus, de asemenea picioare lungi. Coloritul este predominant alb, cu negru pe creștet, ceafă, aripă. Ciocul este negru, iar picioarele albastrii. Strigătul este un "cui-cui". Cuibărește în zone deschise din preajma apelor, pe insule, măr, nisip.
4	Habitat	Pentru hrănire și cuibărit preferă mlaștinile cu apă mică, mărul apelor, marginile de ape nămolose, terenurile sărăturoase.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă, atât ca specie cuibăritoare cât și în pasaj. Astfel, cuibărește în zone umede prielnice mai ales în sudul și estul țării, mai rar în rest. În migrație este mai frecventă și abundentă în aceleași zone, dar apare și în zonele cu măr, inclusiv pe heleșteiele piscicole din interiorul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit în mod neregulat, mai ales primăvara - aprilie-mai și toamna - august- septembrie, însă exemplare izolate sunt observate și în perioada de vară - iunie-iulie, fără a cuibări.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	1-5 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A151 Philomachus pugnax

2	Denumirea populară	Bătăușul
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasărea are lungimea de 30 cm la mascul și 23 cm la femelă, deci cu un dimorfism sexual de mărime evident. Este o specie de mlaștină tipică, cu o siluetă caracteristică limicolelor cu picioare lungi. Ciocul este relativ lung, ușor curbat în jos. În penajul nupțial este ușor recunoscut prin penajul tipic, cu pene ornamentale pe cap și piept, variabile ca și colorit. În rest, penajul este brun pestriț, cu abdomenul albicios. În zbor se vede o dungă îngustă albă pe aripă și târțița alb cu negru. Nu scoate sunete tipice. Cuibărește în zone deschise din nordul Europei.
4	Habitat	Pentru hrănire preferă mlaștinile cu apă mică, mlaștul apelor, marginile de ape nămolose, terenurile sărăturoase. Nu cuibărește în România, fiind doar specie de pasaj.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă în țară, în perioada de pasaj, în funcție de habitatele favorabile de hrănire și odihnă. Este mai frecventă și abundentă în sudul, estul și vestul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit în mod regulat, în ambele pasaje, respectiv primăvara - martie-mai și toamna - august-octombrie, însă exemplare izolate sau grupuri sunt observate și în perioada de vară - iunie-iulie. Este răspândită în sit la nivelul întregii zone umede de la Dumbrăvița și Rotbav, în funcție de structura habitatului specific - mlaștină și apă mică.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	200-300 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A166 Tringa glareola
2	Denumirea populară	Fluierarul de mlaștină
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Specie de limicolă cu lungimea totală de 22 cm. Are ciocul și picioarele lungi. Coloritul este uniform brun pătat pe partea dorsală și albicios pe cea inferioară, cu pieptul și flancurile pătate de brun. Târțița este albă, iar coada albă cu dungi negre transversale. Sunetele tipice de alarmă sunt un "chip-chip- chip" strident. Cuibărește în nordul Europei.
4	Habitat	Pentru hrănire preferă mlaștinile cu apă mică, mlaștul apelor, marginile de ape nămolose, terenurile sărăturoase. Nu cuibărește în România, fiind doar specie de pasaj.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă în țară, în perioada de pasaj, în funcție de habitatele favorabile de hrănire și odihnă. Este mai frecventă și abundentă în sudul, estul și vestul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit în mod regulat, în ambele pasaje, respectiv primăvara - aprilie-mai și toamna - august-septembrie, însă exemplare izolate sau grupuri mici sunt observate și în perioada de vară - iunie-iulie. Este răspândită în sit la nivelul întregii zone umede de la Dumbrăvița și Rotbav, în funcție de structura habitatului specific - mlaștină și apă mică.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj

8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	200-300 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A177 Larus minutus
2	Denumirea populară	Pescărușul mic
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este cea mai mică specie de pescăruș, având lungimea de 26 cm. Adultul în penaj de vară are capul negicios, restul penajului fiind alb pe partea inferioară, aripa având partea dorsală cenușie și cea ventrală negricioasă. Acest ultim caracter se păstrează și la exemplarele în penaj de iarnă, fiind caracteristic. Ciocul mic este roșu închis, picioarele roșii. În penaj de iarnă capul devine albicios, cu o mică pată neagră în spatele ochilor. Juvenilul are o dungă negricioasă pe aripă în formă de "V", o pată neagră pe creștet și ceafă. Nu se reproduce în România actualmente, fiind la noi specie de pasaj și oaspete de iarnă.
4	Habitat	Lacuri diverse, coastele marine, în migrație inclusiv pe heleșteie piscicole.
5	Distribuția în România	Apare în migrație și iarna pe diverse lacuri și pe mare, mai ales în sud-est și mai rar în centru.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna, dar uneori rămâne și anumite perioade din iarnă pe luciile neînghețate și primăvara în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav, mai ales heleșteiele și lacurile, dar și Oltul.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	20-40 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A193 Sterna hirundo
2	Denumirea populară	Chira de baltă
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este o pasăre cu formă zveltă, aripi lungi și înguste, coada bifurcată, ciocul relativ lung și subțire. Lungimea totală este de 35 cm. Adultul are creștetul și ceafa neagră, partea inferioară albicioasă, aripile dorsal cenușii deschise. Ciocul este roșu cu vârful negru. În penaj de iarnă fruntea este albă. Zborul este acrobatic, adesea plonjând în apă după peștișori. Produce mai multe tipuri de sunete, cum sunt strigătele: "chit", "criii-i". În România cuibărește pe multe lacuri, bălți, pe insule și coasta mării, fiind la noi și specie de pasaj.
4	Habitat	Lacuri diverse, coastele marine, în migrație inclusiv pe heleșteie piscicole.

5	Distribuția în România	Cuibărește mai frecvent în sud, est și mai ales în Delta Dunării. Apare în migrație pe diverse lacuri și pe mare, inclusiv în centrul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna și primăvara, dar uneori sunt exemplare și vara, fără a cuibări, în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav - mai ales heleșteiele și lacurile, dar și Oltul.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	15-20 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A196 Chlidonias hybridus
2	Denumirea populară	Chirighița cu obraz alb
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Ca și chira de baltă, este o pasăre cu formă zveltă, aripi lungi și înguste, coada doar puțin bifurcată, ciocul roșu închis în penajul de vară. Are o lungime totală de 25 cm. Adultul în penaj de vară are creștetul negru, obrazul alb, partea inferioară negriciosă, aripile și spatele cenușii deschis. În penaj de iarnă fruntea este albă, ciocul negricios. Zborul este acrobatic, capturând diverse animale mici de la suprafața apei. Sunetul cel mai frecvent este un "câr, câr". În România cuibărește pe multe lacuri, bălți, fiind la noi și specie de pasaj.
4	Habitat	Lacuri diverse, bogate în vegetație submersă sau natantă, în migrație inclusiv pe heleșteie piscicole.
5	Distribuția în România	Cuibărește mai frecvent în sud, est, vest și mai ales în Delta Dunării. Apare în migrație pe diverse lacuri și pe mare, inclusiv în centrul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apre în sit toamna și mai ales primăvara, dar uneori sunt exemplare sau mici grupuri și vara, fără a cuibări, în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav - mai ales heleșteiele și lacurile, dar și Oltul.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	40-50 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A197 Chlidonias niger

2	Denumirea populară	Chirighița neagră
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Se aseamănă ca formă cu chirighița cu obraz alb, având o lungime totală de 24 cm. Adultul în penaj de vară este negicios pe cap și partea inferioară, aripile și spatele fiind cenușii deschis. În penaj de iarnă fruntea devine albă, având o mică pată negricioasă pe umăr. Sunetul cel mai frecvent este un "chie" repetat. În România cuibărește pe multe lacuri, bălți, fiind la noi și specie de pasaj.
4	Habitat	Lacuri diverse, bogate în vegetație submersă sau natantă, în migrație inclusiv pe heleșteie piscicole.
5	Distribuția în România	Cuibărește mai frecvent în sud, est, vest și mai ales în Delta Dunării. Apare în migrație pe diverse lacuri și pe mare, inclusiv în centrul țării.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Apare în sit toamna și mai ales primăvara, dar uneori sunt exemplare sau mici grupuri și vara, fără a cuibări în habitatele specifice de hrănire și odihnă - luciul apei. Din acest punct de vedere, distribuția sa este legată de habitatul caracteristic, respectiv întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav - mai ales heleșteiele și lacurile, dar și Oltul. Este una din speciile de păsări cu cele mai mari efective în migrație raportat la zona centrală a României.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație de pasaj
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	300-400 indivizi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	Nu există o evaluare a populației de pasaj la nivel național.
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A215 Bubo bubo
2	Denumirea populară	Buha mare
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este cea mai mare specie de bufniță din țară, cu o lungime totală de 69 cm. Are o siluetă impozantă, corpul voluminos, capul mare, prevăzut cu două urechi vizibile, un disc facial relativ bine conturat și ochii cu irisul de culoare portocalie. Coloritul este uniform brun, cu pete negricioase pe piept, spate și aripi. Zborul este relativ rapid și silențios, cu bătaii de aripi viguroase. Cântecul teritorial este un bine cunoscut "u-uh" bi-silabic, cu a doua notă mai joasă și accent pe prima. Emite și alte sunete. Cuibărește de regulă pe stâncării, în păduri direct pe sol, în maluri verticale lutoase. Depunerea pondei are loc direct pe substrat.
4	Habitat	Pentru cuibărit preferă mai ales stâncăriile de tipul cheilor sau cele izolate, de regulă din păduri. Cuibărește însă și în păduri fără stâncării, în Delta Dunării chiar în stuf. Vânează mai ales pe teren deschis, precum pajiști, culturi, liziere, zone umede, sau la marginea localităților. Habitatul din afara sezonului de reproducere este asemănător cu cel de procurare a hranei din timpul cuibăritului.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă la nivel național, în funcție de habitatul preferat. Este mai răspândită în zone de podiș și montane din centrul țării, Moldova și Muntenia și absentă în mare parte din zonele de câmpie.

6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Specia aparține tipului fenologic "sedentară", cuibărind regulat în sit. Singura zonă de reproducere a sa din sit este reprezentată de șirul stâncilor de pe versantul vestic al Măgurii Codlei, posibil însă și unele stânci de pe cel estic sau nordic, unde nu s-a identificat ca cert cuibăritoare, dar s-au determinat semne specifice a prezenței sale - ingluvii, pene.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație rezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	1-2 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,1 - 0,2 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A220 Strix uralensis
2	Denumirea populară	Huhurezul mare
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este o bufniță de talie mare, cu o lungime totală de 60 cm. Se recunoaște după discul facial foarte vizibil lipsa "urechilor" pe cap și ochii cu irisul negru. Se observă coada lungă. Coloritul este cenușiu sau brun, cu diverse nuanțe, până la brun închis. Partea inferioară este albicioasă cu numeroase striuri negricioase longitudinale. Cântecul teritorial este caracteristic: "hu-u - pauză de 4 secunde - hu-hu-hu hu-hu-hu" precum și un "up-up-up" cu note grave. Emite și alte sunete, precum un "cah", scos de femelă. Sunetul de alarmă este asemănător lătratului unui câine. Cuibărește în păduri mature sau bătrâne de tipul fâgetelor, pădurilor mixte sau în molidișuri. Cuibul este amplasat în scorburi mari, în partea ruptă a iescarilor sau în cuiburi vechi ale unor păsări de talie mare.
4	Habitat	Cuibărește în diverse tipuri de habitate forestiere, preferând pădurile mature/bătrâne de fag, mixte sau conifere - molidișuri. Necesită arbori mari, scorburoși sau iesacri pentru amplasarea cuibului. În perioada reproducerii se hrănește și în terenuri deschise, cum sunt poienile, lizierele. În afara sezonului de cuibărit hrana este capturată uneori predominant din zone deschise din afara pădurilor.
5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ uniformă de-a lungul lanțului carpatic, dar apare și în pădurile favorabile din depresiuni și zonele mai joase. Lipsește din zonele de câmpie, unde poate totuși cuibări în păduri favorabile.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Este răspândită aproape exclusiv în aria Măgura Codlei, în pădurile de fag mature/bătrâne, unde există locații favorabile de cuibărit. Cele mai multe perechi sunt prezente pe zona abrupturilor măgurii, pe toți versanții.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație rezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	7-8 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Bună

10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,04 - 0,06 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A229 Alcedo atthis
2	Denumirea populară	Pescărelul albastru
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este o pasăre de 18 cm, cu o formă caracteristică: capul mare, corpul îndesat, coada scurtă și ciocul lung, conic. Are unul din cele mai frumoase penaje dintre păsările sălbatice de la noi. Creștetul, spatele, aripile și o parte din obraz sunt albastre metalizat, în diferite nuanțe, pieptul și burta portocalii, gușa cu o pată albă. Picioarele sunt roșii. Zboară drept, rapid, de multe ori la "rasul apei", de multe ori producând strigătul: "țiii, țiii". Adesea stă pe crengi desupra apei, de unde pândește peștii, apoi plonjează scufundându-se total. Cuibărește în malurile verticale lutoase din albiile apelor curgătoare sau alte locuri prielnice. Cuibul este amplasat prin săpare în malul vertical.
4	Habitat	Este o specie ce preferă zonele umede, formate mai ales din albiile apelor curgătoare, dar și diverse lacuri, heleșteie de unde se hrănește.
5	Distribuția în România	Are o distribuție legată de habitatele caracteristice de cuibărit și hrănire, fiind prezentă mai ales în Delta Dunării și pe toate apele curgătoare unde are condiții de cuibărit. În afara sezonului de cuibărit și în perioada de reproducere uneori, capturează hrana și pe lacuri, iazuri, heleșteie.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit. Este răspândit în ariile Dumbrăvița și Rotbav, cuibărind în malurile lutoase verticale ale Hamaradiei - Homorod/Ciucaș și Oltului, iar hrănirea are loc în principal pe toată zona umedă, cu precădere pe heleșteie și canale.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație rezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	10-15 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,08 - 0,1 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A236 Dryocopus martius
2	Denumirea populară	Ciocănitoarea neagră
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este cea mai mare ciocănitoare de la noi, având o lungime totală de 45 cm. Se recunoaște foarte ușor după talia mare și coloritul negru, cu creștetul roșu extins la mascul și doar sub forma unei pete la femelă. De asemenea, are un cioc conic puternic de culoare gălbuie. Zborul este drept, nu ondulat ca la celelalte ciocănitori. Strigătele cele mai tipice sunt un "cliiuu" prelung, un "cru-cru- cru" de alarmă produs în zbor. Cuibărește în păduri mature sau bătrâne de tipul fâgetelor, pădurilor mixte sau în molidișuri. Cuibul este săpat în arborii mari.
4	Habitat	Cuibărește în diverse tipuri de habitate forestiere, preferând pădurile mature/bătrâne de fag, mixte sau conifere - molidișuri. Necesită arbori mari, scorburoși sau parțial/total uscați.

5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ uniformă de-a lungul lanțului carpatic, dar apare și în pădurile favorabile din depresiuni și zonele mai joase, inclusiv în cele din Dobrogea sau din deltă.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit. Este răspândită aproape exclusiv în aria Măgura Codlei, în pădurile de fag mature/bătrâne, unde există locații favorabile de cuibărit. Hrănirea se face și în alte tipuri de arborete din arie, inclusiv în unele plantații de rășinoase atacate de insecte.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație rezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	4-5 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,01 - 0,01 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A239 Dendrocopos leucotos
2	Denumirea populară	Ciocănitorea cu spate alb
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este cea mai mare dintre ciocănitorele pestrițe de la noi, cu o lungime de 25 cm. Penajul este negru cu alb pe partea dorsală, alb pe cea inferioară. Se recunoaște față de alte ciocănitore cu penaj asemănător, prin spatele de culoare albă. Masculul are creștetul roșu și subcodalele roșu deschis. Pe flancuri are câteva striuri negricioase longitudinale. Strigătul este un "chic", iar darabana durează 1,7 secunde, spre final scăzând în intensitate. Cuibărește în păduri mature sau bătrâne de fag. Cuibul este săpat în arborii mari.
4	Habitat	Cuibărește îndeosebi în pădurile mature/bătrâne de fag, mai rar mixte. Necesită arbori mari, parțial/total uscați. Prezența lemnului mort pe picior este esențială.
5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ uniformă de-a lungul lanțului carpatic, dar apare și în pădurile favorabile din zonele mai joase, inclusiv în cele din Dobrogea.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit. Este răspândită exclusiv în aria Măgura Codlei, în pădurile de fag mature/bătrâne, unde există locații favorabile de cuibărit. Hrănirea/dispersia se face și în alte tipuri de arborete din arie, inclusiv în unele plantații de rășinoase atacate de insecte.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație rezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	20-30 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,12 - 0,12 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A238 Dendrocopos medius
2	Denumirea populară	Ciocănitorea de stejar

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este una dintre ciocănitorile pestrițe de talie mai mică, cu o lungime de 20 cm. Penajul este asemănător cu cel al celorlalte ciocănitori pestrițe, având flancurile evident ciliate longitudinal, mustața neagră nu atinge ciocul și ceafa. Masculul are creștetul roșu aprins și subcodalele roșu deschis. Femela are, de asemenea, creștetul roșu, dar mai șters. Strigătul din perioada cuibăritului este un "miaic" nazal și intens. Strigă și "chic" sau "chec", sacadat.
4	Habitat	Cuibărește îndeosebi în pădurile mature/bătrâne de gorun și stejar, dar și în cele mixte de foioase, unde sunt prezente în anumite procente cvercineele. Necesită arbori mari, parțial/total uscați. Prezența lemnului mort pe picior este esențială. Cuibărește îndeosebi în pădurile mature/bătrâne de gorun și stejar, dar și în cele mixte de foioase, unde sunt prezente în anumite procente cvercineele. Cuibul este săpat în arborii mari.
5	Distribuția în România	Are o distribuție legată de pădurile favorabile din zonele colinare și depresionare, precum și în cele de câmpie.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit. Este răspândită în ariile Măgura Codlei și Dumbrăvița, în pădurile de cvercinee și amestec a diferitelor foioase mature/bătrâne, unde există locații favorabile de cuibărit și hrănire.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație rezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	25-30 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,12 - 0,12 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A234 Picus canus
2	Denumirea populară	Ghionoaia sură
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este o ciocănitoare mare, având o lungime totală de 27 cm. Se recunoaște ușor după coloritul verzui al părții dorsale și cel cenușiu deschis pe partea ventrală. Ambele sexe prezintă o mustața neagră, iar masculul o pată roșie pe creștet, caracter ce lipsește la femelă. Juvenilul seamănă cu femela. Zborul este ondulat. Strigătele de primăvară sunt un "chi- chi-chi-cu-cu", cu o evidentă scădere în tonalitate spre sfârșit. Strigătul de alarmă este un "chia" alert. Cuibărește în păduri diverse mature/bătrâne, parcuri, grădini. Cuibul este săpat în arborii mari.
4	Habitat	Cuibărește în diverse tipuri de habitate, preferând pădurile mature/bătrâne de foioase sau mixte, dar și luncile râurilor, parcurile și grădinile mari. Necesită arbori mari, parțial/total uscați.
5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ uniformă în țară, mai ales în zonele joase și colinare/de depresiuni.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit. Este răspândită în ariile Măgura Codlei, în pădurile mature/bătrâne, unde există locații favorabile de cuibărit și în stejăretul din aria Dumbrăvița. Câteva perechi cuibăresc și în sălcelele bătrâne din lunca Hamaradiei.

7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație rezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	10-15 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,02 - 0,02 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A338 Lanius collurio
2	Denumirea populară	Sfrânciocul roșiatic
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre de talie mică, de 18 cm. Deși nu are o talie mare, pare mai impozantă. Dimorfismul sexual este destul de pronunțat. Masculul adult are creștetul, ceafa și târtița cenușii, spatele și aripa roșcate, coada neagră cu baza penelor externe albă. Se remarcă peste ochi o dungă neagră. Partea inferioară este albicios-gălbui. Femela și juvenilul sunt bruni pe partea dorsală, albicioși pe cea ventrală, cu numeroase striuri semicirculare. Juvenilul este mai pătat pe cap și spate. Strigătul este scurt: "chec" sau "zec". Cântecul poate cuprinde imitarea cântecului altor păsări. Cuibărește în zone semi-deschise, precum: liziere, tufărișuri. Cuibul este construit de regulă în arbuști, la diferite înălțimi.
4	Habitat	Cuibărește în terenuri semi-deschise de tipul lizierelor, tufărișurilor, mai ales dacă există arbuști țepoși - măceș, păducel, porumbar. Apare însă și în alte habitate, precum: parcuri, livezi, vii, grădini. Are preferință pentru zonele mai uscate.
5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ uniformă în țară, în toată zona joasă și colinară, fiind una din speciile relativ abundente.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit. Este răspândită în ariile Măgura Codlei și Dumbrăvița, în zonele de lizieră și de tufărișuri - pâlcuri, izolate sau sub formă de benzi/fâșii.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	20-25 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,001 - 0,001 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A307 Sylvia nisoria
2	Denumirea populară	Silvia porumbacă

3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Este o pasăre de talie mică, cu o lungime totală de 15,5 cm. Adultul se recunoaște după coloritul uniform brun pe spate, partea inferioară albicioasă cu numeroase striuri transversale. Irisul este galben deschis, contrastând cu penajul cenușiu-negricios al capului. Juvenilul este mai șters, fără dungi pe partea inferioară și cu o dungă negricioasă peste ochi. Cântecul este sonor și melodios. Strigătele de primăvară sunt un "chi-chi-chi- cu-cu", cu o evidentă scădere în tonalitate spre sfârșit. Strigătul este aspru, un "tcerr, țrrr-tt-t". Cuibărește în zone semi-deschise, precum: liziere bogate în arbuști, tufărișurile. Cuibul este construit de regulă în arbuști, la diferite înălțimi.
4	Habitat	Cuibărește în terenuri semi-deschise de tipul lizierelor bogate în subarboret, tufărișurilor, mai ales dacă există arbuști țepoși.
5	Distribuția în România	Are o distribuție punctiformă în țară, mai ales în zonele joase uscate, unde există habitate specifice, dar este o specie rară.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește în sit în aria Dumbrăvița, în zonele de tufărișuri - pâlcuri, izolate sau sub formă de benzi/fâșii.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	3-4 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,010 - 0,012 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A321 Ficedula albicollis
2	Denumirea populară	Muscarul gulerat
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre de talie mică, cu lungimea de 13 cm, recunoscut în afara penajului după obiceiul de a prinde musculițe prin lansare de pe o cracă și revenirea de multe ori în același loc după capturare. Dimorfismul sexual este foarte pronunțat, masculul având un colorit negru cu alb, foarte contrastant. Astfel, capul parțial, spatele, aripa parțial și coada sunt negre, partea inferioară, o pată pe aripă și fruntea sunt albe. Se remarcă printr-un guler alb ce separă părțile negre de pe cap și spate. Strigătul tipic este un "țip" sonor. Cântecul este un "ți-ți-țiu-si". Cuibărește în păduri diverse mature/bătrâne. Cuibul este construit în scorburile naturale sau vechi cuiburi de ciocânitori, în crăpăturile mari ale scoarței.
4	Habitat	Cuibărește în diverse tipuri de habitate forestiere, preferând pădurile mature/bătrâne de foioase, îndeosebi fâgetele, dar și amestecurile de foioase sau cvercineele. Necesită arbori mari, scorbușori.
5	Distribuția în România	Are o distribuție relativ uniformă în țară, mai ales în zonele colinare și depresiuni.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit. Este răspândită în aria Măgura Codlei, în pădurile mature/ bătrâne, unde există locații favorabile de cuibărit și în stejăretul din aria Dumbrăvița.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare

8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	250-450 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,05 - 0,06 %, <1%
1	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	A320 Ficedula parva
2	Denumirea populară	Muscarul mic
3	Descrierea speciei - morfologie, biologie	Pasăre mică, de 11,5 cm. Dimorfismul sexual nu este atât de evident. Masculul adult în perioada nupțială are capul cenușiu, spatele și aripa brune, coada neagră cu penele externe parțial albe, abdomenul alb, gușa și parțial pieptul portocalii. Femela este mai ștearsă, neavând gușa portocalie. Are obiceiul de a-și ridica coada. Strigătul tipic este un "cic". Cântecul este un "ți-ți-și-siu-si". Cuibărește în făgete mature/bătrâne. Cuibul este construit în scorburile naturale sau vechi cuiburi de ciocănitori, în crăpăturile mari ale scoarței.
4	Habitat	Cuibărește cu precădere în pădurile mature/bătrâne de fag. Necesită arbori mari, scorburoși.
5	Distribuția în România	Are o distribuție națională legată mai ales de făgetele de deal și montane.
6	Distribuția în aria naturală protejată - descriptiv	Cuibărește regulat în sit, fiind răspândită în aria Măgura Codlei.
7	Tipul populației speciei în aria naturală protejată	Populație nerezidentă cuibăritoare
8	Mărimea populației speciei în aria naturală protejată	60-80 perechi
9	Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată	Medie
10	Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și cea națională	0,02 - 0,02 %, <1%

Hărțile de distribuție ale speciilor de păsări de interes comunitar sunt prezentate în Anexa nr. 9 la Planul de management.

Hărțile de distribuție ale habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar sunt prezentate în Anexa nr. 10 la Planul de management.

2.3.4.5. Mamifere

Speciile de mamifere incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

Mamifere de interes comunitar, ce populează situl, sunt: Castor fiber și Lutra lutra. Cele două specii sunt răspândite îndeosebi în ariile Rotbav și Dumbrăvița, ocupând practic toate habitatele de zone umede favorabile - cursurile apelor curgătoare, canalele, o parte din lacuri și heleșteie. Ambele sunt specii criteriu de desemnare pentru ROSCI0329 Oltul Superior. Alte

specii de mamifere de interes comunitar din sit, sunt: *Ursus arctos*, *Canis lupus*, *Lynx lynx*, toate răspândite îndeosebi la nivelul ariei Măgura Codlei.

2.3.5. Alte specii relevante

2.3.5.1. Flora

În mlaștinile eutrofe existente în zona malului nord-vestic al lacului de acumulare Dumbrăvița și în unele rogozuri de pe două din heleșteiele piscicole din zona Satu Nou, se remarcă specii de plante importante din punct de vedere conservativ, incluse în Lista roșie a plantelor superioare din România: daria - *Pedicularis sceptrum-carolinum*, trifoiștea - *Menyanthes trifoliata*, șapte degete - *Comarum palustre*, bibilica - *Fritilaria meleagris*, bulbuci - *Trolius europaeus*, gălbenele - *Ligularia sibirica*.

2.3.5.2. Fauna

Dintre speciile de amfibieni de interes comunitar, foarte răspândită este *Bombina variegata*, ce ocupă majoritatea bălților temporare, inclusiv a celor rezultate din degradarea unor drumuri de pământ. O altă specie, mai puțin răspândită este *Triturus cristatus*. Aceste două specii sunt incluse în obiectivele de conservare ale ROSCI0329 Oltul Superior.

Toate cele 105 de specii de păsări, cu migrație regulată nementionate în Directiva 2009/147/CE, incluse în formularul standard al sitului, au fost identificate în cadrul proiectului sau în ultimii ani de către specialiștii custodelui, fiind prezentate în Tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

Centralizator cu speciile de păsări migrație regulată nementionate în Anexa I a Directivei 2009/147/CEE, incluse în formularul standard al sitului

Număr curent	Cod Natura 2000/Denumirea științifică	Denumirea populară	Identificare în sit
1.	A317 <i>Regulus regulus</i>	Aușel cu cap galben	Identificată
2.	A318 <i>Regulus ignicapilus</i>	Aușel sprâncenat	Identificată
3.	A153 <i>Gallinago gallinago</i>	Becațină comună	Identificată
4.	A373 <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Botgros	Identificată
5.	A366 <i>Carduelis cannabina</i>	Cânepar	Identificată
6.	A118 <i>Rallus aquaticus</i>	Cârstei de baltă	Identificată
7.	A198 <i>Chlidonias leucopterus</i>	Chirighița cu aripi albe	Identificată
8.	A359 <i>Fringilla coelebs</i>	Cinteză	Identificată
9.	A360 <i>Fringilla monifringilla</i>	Cinteză de iarnă	Identificată
10.	A284 <i>Turdus pilaris</i>	Cocoșar	Identificată
11.	A262 <i>Motacilla alba</i>	Codobatură albă	Identificată
12.	A261 <i>Motacilla cinerea</i>	Codobatură de munte	Identificată
13.	A260 <i>Motacilla flava</i>	Codobatură galbenă	Identificată
14.	A273 <i>Phoenicurus ochruros</i>	Codroș de munte	Identificată

15.	A274 <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codroș de pădure	Identificată
16.	A008 <i>Podiceps nigricollis</i>	Corcodel cu gât negru	Identificată
17.	A006 <i>Podiceps grisegena</i>	Corcodel cu gât roșu	Identificată
18.	A005 <i>Podiceps cristatus</i>	Corcodel mare	Identificată
19.	A004 <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Corcodel mic	Identificată
20.	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormoran mare	Identificată
21.	A212 <i>Cuculus canorus</i>	Cuc	Identificată
22.	A160 <i>Numenius arquata</i>	Culic mare	Identificată
23.	A259 <i>Anthus spinoletta</i>	Fâsă de munte	Identificată
24.	A258 <i>Anthus cervinus</i>	Fâsă roșcată	Identificată
25.	A070 <i>Mergus merganser</i>	Ferestraș mare	Identificată
26.	A069 <i>Mergus serrator</i>	Ferestraș moțat	Identificată
27.	A363 <i>Carduelis chloris</i>	Florinte	Identificată
28.	A162 <i>Tringa totanus</i>	Fluierar cu picioare roșii	Identificată
29.	A164 <i>Tringa nebularia</i>	Fluierar cu picioare verzi	Identificată
30.	A168 <i>Actitis hypoleucos</i>	Fluierar de munte	Identificată
31.	A165 <i>Tringa ochropus</i>	Fluierar de zăvoi	Identificată
32.	A161 <i>Tringa erythropus</i>	Fluierar negru	Identificată
33.	A149 <i>Calidris alpina</i>	Fugaci de țărâm	Identificată
34.	A145 <i>Calidris minuta</i>	Fugaci mic	Identificată
35.	A146 <i>Calidris temminckii</i>	Fugaci pitic	Identificată
36.	A147 <i>Calidris ferruginea</i>	Fugaci roșcat	Identificată
37.	A123 <i>Gallinula chloropus</i>	Găinușă de baltă	Identificată
38.	A041 <i>Anser albifrons</i>	Gârliță mare	Identificată
39.	A039 <i>Anser fabalis</i>	Gâscă de semănătură	Identificată
40.	A043 <i>Anser anser</i>	Gâscă de vară	Identificată
41.	A351 <i>Sturnus vulgaris</i>	Graur	Identificată
42.	A292 <i>Locustella luscinioides</i>	Grelușel de stuf	Identificată
43.	A291 <i>Locustella fluviatilis</i>	Grelușel de zăvoi	Identificată
44.	A297 <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Lăcar de lac	Identificată
45.	A296 <i>Acrocephalus palustris</i>	Lăcar de mlaștină	Identificată
46.	A298 <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Lăcar mare	Identificată
47.	A295 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Lăcar mic	Identificată
48.	A249 <i>Riparia riparia</i>	Lăstun de mal	Identificată
49.	A036 <i>Cygnus olor</i>	Lebădă de vară	Identificată
50.	A125 <i>Fulica atra</i>	Lișiță	Identificată
51.	A269 <i>Erithacus rubecula</i>	Măcăleandru	Identificată

52.	A275 Saxicola rubetra	Mărăcinar mare	Identificată
53.	A276 Saxicola torquata	Mărăcinar negru	Identificată
54.	A283 Turdus merula	Mierlă	Identificată
55.	A372 Pyrrhulla pyrrhulla	Mugurar	Identificată
56.	A322 Ficedula hypoleuca	Muscar negru	Identificată
57.	A319 Muscicapa striata	Muscar sur	Identificată
58.	A142 Vanellus vanellus	Nagâț	Identificată
59.	A183 Larus fuscus	Pescăruș negricios	Identificată
60.	A459 Larus cachinnans	Pescăruș pontic	Identificată
61.	A179 Larus ridibundus	Pescăruș râzător	Identificată
62.	A182 Larus canus	Pescăruș sur	Identificată
63.	A316 Phylloscopus trochilus	Pitulice fluierătoare	Identificată
64.	A315 Phylloscopus collybita	Pitulice mică	Identificată
65.	A314 Phylloscopus sibilatrix	Pitulice sfârâitoare	Identificată
66.	A336 Remiz pendulinus	Pițigoi pungar	Identificată
67.	A141 Pluvialis squatarola	Ploier argintiu	Identificată
68.	A207 Columba oenas	Porumbel de scorbură	Identificată
69.	A208 Columba palumbus	Porumbel gulerat	Identificată
70.	A113 Coturnix coturnix	Prepeliță	Identificată
71.	A383 Milliaria calandra	Presură sură	Identificată
72.	A270 Luscinia luscinia	Privighetoare de zăvoi	Identificată
73.	A271 Luscinia megarhynchos	Privighetoare roșcată	Identificată
74.	A150 Limicola falcinellus	Prundaș de nămol	Identificată
75.	A137 Charadrius hiaticula	Prundăraș gulerat mare	Identificată
76.	A136 Charadrius dubius	Prundăraș gulerat mic	Identificată
77.	A055 Anas querquedula	Rață cârâitoare	Identificată
78.	A059 Aythya ferina	Rață cu cap castaniu	Identificată
79.	A058 Netta rufina	Rață cu ciuf	Identificată
80.	A050 Anas penelope	Rață fluierătoare	Identificată
81.	A056 Anas clypeata	Rață lingurar	Identificată
82.	A053 Anas platyrhynchos	Rață mare	Identificată
83.	A052 Anas crecca	Rață mică	Identificată
84.	A061 Aythya fuligula	Rață moțată	Identificată
85.	A051 Anas strepera	Rață pestriță	Identificată
86.	A054 Anas acuta	Rață sulițar	Identificată
87.	A067 Bucephala clangula	Rață sunătoare	Identificată
88.	A251 Hirundo rustica	Rândunică	Identificată
89.	A365 Carduelis spinus	Scatiu	Identificată

90.	A340 Lanius excubitor	Sfrâncioc mare	Identificată
91.	A309 Sylvia communis	Silvie cenușie	Identificată
92.	A311 Sylvia atricapilla	Silvie cu cap negru	Identificată
93.	A310 Sylvia borin	Silvie de grădină	Identificată
94.	A308 Sylvia curruca	Silvie mică	Identificată
95.	A156 Limosa limosa	Sitar de mal	Identificată
96.	A364 Carduelis carduelis	Sticlete	Identificată
97.	A285 Turdus philomelos	Sturz cântător	Identificată
98.	A287 Turdus viscivorus	Sturz de vâsc	Identificată
99.	A286 Turdus iliacus	Sturz de vii	Identificată
100.	A099 Falco subbuteo	Șoimul rândunelelor	Identificată
101.	A087 Buteo buteo	Șorecar comun	Identificată
102.	A088 Buteo lagopus	Șorecar încălțat	Identificată
103.	A210 Streptopelia turtur	Turturică	Identificată
104.	A086 Accipiter nisus	Uliu păsărar	Identificată
105.	A096 Falco tinnunculus	Vânturel roșu	Identificată

În continuare se prezintă informații succinte despre speciile identificate în aria naturală protejată, informații importante pentru managementul sitului.

A317 *Regulus regulus* - Aușel cu cap galben

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, mai ales plantațiile de conifere.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A318 *Regulus ignicapilus* - Aușel sprâncenat

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, mai ales plantațiile de conifere, vegetație de luncă.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A153 *Gallinago gallinago* - Becațină comună

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A373 *Coccothraustes coccothraustes* - Botgros

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, lunca apelor curgătoare, unele terenuri deschise cu culturi.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A366 *Carduelis cannabina* - Cânepar

Distribuție în aria naturală protejată: zone deschise și semi-deschise, cu arbuști, liziere.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A118 *Rallus aquaticus* - Cârstei de baltă

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav, mai ales suprafețele de vegetație emersă.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A198 *Chlidionas leucopterus* - Chirighița cu aripi albe

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A359 *Fringilla coelebs* - Cinteză

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise cu arbori izolați sau în grupuri.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A360 *Fringilla montifringilla* - Cinteză de iarnă

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise cu arbori izolați sau în grupuri.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A284 *Turdus pilaris* - Coccoșar

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise cu arbori izolați sau în grupuri.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A262 *Motacilla alba* - Codobatură albă

Distribuție în aria naturală protejată: zone deschise sau semi-deschise, liziere, lunci, zonele umede.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A261 *Motacilla cinerea* - Codobatură de munte

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede ale sitului, mai ales apele curgătoare.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A260 *Motacilla flava* - Codobatură galbenă

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede ale sitului, pajiștile, unele culturi.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A273 *Phoenicurus ochrurus* - Codroș de munte

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A274 *Phoenicurus phoenicurus* - Codroș de pădure

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A008 *Podiceps nigricollis* - Corcodel cu gât negru

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A006 *Podiceps grisegena* - Corcodel cu gât roșu

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A005 *Podiceps cristatus* - Corcodel mare

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A004 *Tachybaptus ruficollis* - Corcodel mic

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A017 *Phalacrocorax carbo* - Cormoran mare

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A212 *Cuculus canorus* - Cuc

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise, pajiști, lunci, practic toate tipurile de habitat din sit.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A160 Numenius arquata - Culic mare

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A259 Anthus spinoletta - Fâsă de munte

Distribuție în aria naturală protejată: pajiști, zone mlăștinoase.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A258 Anthus cervinus Fâsă roșcată

Distribuție în aria naturală protejată: pajiști, zone mlăștinoase.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A070 Mergus merganser - Ferestraș mare

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A069 Mergus serrator - Ferestraș moțat

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A363 Carduelis chloris - Florinte

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise, pajiști, lunci.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A162 *Tringa totanus* - Fluierar cu picioare roșii

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A164 *Tringa nebularia* - Fluierar cu picioare verzi

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A168 *Actitis hypoleucos* - Fluierar de munte

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A165 *Tringa ochropus* - Fluierar de zăvoi

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A161 *Tringa erythropus* - Fluierar negru

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A149 *Calidris alpina* - Fugaci de țărâm

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A145 *Calidris minuta* - Fugaci mic

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A146 *Calidris temminckii* - Fugaci pitic

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A147 *Calidris ferruginea* - Fugaci roșcat

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A123 *Gallinula chloropus* - Găinușă de baltă

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A041 *Anser albifrons* - Gârliță mare

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A039 *Anser fabalis* - Gâscă de semănătură

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A043 *Anser anser* - Gâscă de vară

Distribuție în aria naturală protejată: întreaga zonă umedă Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A351 *Sturnus vulgaris* - Graur

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise, pajiști, lunci, practic toate tipurile de habitat din sit.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A292 *Locustella luscinioides* - Grelușel de stuf

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav, mai ales în zona vegetației emerse.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A291 *Locustella fluviatilis* - Grelușel de zăvoi

Distribuție în aria naturală protejată: lunca râului Olt și Homorod/Ciucaș.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A297 *Acrocephalus scirpaceus* - Lăcar de lac

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav, mai ales în zona vegetației emerse.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A296 *Acrocephalus palustris* - Lăcar de mlaștină
Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.
Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A298 *Acrocephalus arundinaceus* - Lăcar mare
Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav, mai ales în zona vegetației emerse.
Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A295 *Acrocephalus schoenobaenus* - Lăcar mic
Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.
Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A249 *Riparia riparia* - Lăstun de mal
Distribuție în aria naturală protejată: cursul Oltului, suprafețele de apă ale zonelor umede Dumbrăvița și Rotbav.
Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A036 *Cygnus olor* - Lebădă de vară
Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.
Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A125 *Fulica atra* - Lișiță
Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.
Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A269 *Erithacus rubecula* - Măcăleandru
Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise, lunci.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A275 Saxicola rubetra - Mărăcinar mare

Distribuție în aria naturală protejată: zone semi-deschise, pajiști cu arbuști, liziere.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A276 Saxicola torquata - Mărăcinar negru

Distribuție în aria naturală protejată: zone semi-deschise, pajiști cu arbuști, liziere.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A283 Turdus merula - Mierlă

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise, lunci.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A372 Pyrrhula pyrrhula - Mugurar

Distribuție în aria naturală protejată: păduri.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A322 Ficedula hypoleuca - Muscar negru

Distribuție în aria naturală protejată: păduri.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A319 Muscicapa striata - Muscar sur

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A142 *Vanellus vanellus* - Nagâț

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav, unele terenuri agricole inundate temporar.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A183 *Larus fuscus* - Pescăruș negricios

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A459 *Larus cachinnans* - Pescăruș pontic

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A179 *Larus ridibundus* - Pescăruș râzător

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A182 *Larus canus* - Pescăruș sur

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A316 *Phylloscopus trochilus* - Pitulice fluierătoare

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, lunci, zone semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A315 *Phylloscopus collybita* - Pitulice mică

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, lunci, zone semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A314 *Phylloscopus sibilatrix* - Pitulice sfârâitoare

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, lunci, zone semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A336 *Remiz pendulinus* - Pițigoi pungar

Distribuție în aria naturală protejată: luncile apelor curgătoare și marginile împădurite ale unor lacuri.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A141 *Pluvialis squatarola* - Ploier argintiu

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A207 *Columba oenas* - Porumbel de scorbură

Distribuție în aria naturală protejată: păduri bătrâne de foioase, deschideri din păduri, lunci.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A208 *Columba palumbus* - Porumbel gulerat

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, deschideri din păduri, lunci.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A113 *Coturnix coturnix* - Prepeliță

Distribuție în aria naturală protejată: terenurile deschise, mai ales pajiști și unele culturi din ariile Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A383 *Milliaria calandra* - Presură sură

Distribuție în aria naturală protejată: terenurile deschise și semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A270 *Luscinia luscinia* - Privighetoare de zăvoi

Distribuție în aria naturală protejată: luncile apelor curgătoare.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A271 *Luscinia megarhynchos* - Privighetoare roșcată

Distribuție în aria naturală protejată: pădurile deschise, luncile apelor curgătoare.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A150 *Limicola falcinellus* - Prundaș de nămol

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A137 *Charadrius hiaticula* - Prundăraș gulerat mare

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A136 *Charadrius dubius* - Prundăraș gulerat mic

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A055 *Anas querquedula* - Rață cârâitoare

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A059 *Aythya ferina* - Rață cu cap castaniu

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A058 *Netta rufina* - Rață cu ciuf

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A050 *Anas penelope* - Rață fluierătoare

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A056 *Anas clypeata* - Rață lingurar

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A053 *Anas platyrhynchos* - Rață mare

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A052 *Anas crecca* - Rață mică

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A061 *Aythya fuligula* - Rață moțată

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A051 *Anas strepera* - Rață pestriță

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A054 *Anas acuta* - Rață sulițar

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A067 *Bucephala clangula* - Rață sunătoare

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A251 *Hirundo rustica* - Rândunică

Distribuție în aria naturală protejată: suprafețele de apă ale zonelor umede Dumbrăvița și Rotbav, terenurile deschise și semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A365 *Carduelis spinus* - Scatiu

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, zone semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A340 *Lanius excubitor* - Sfrâncioc mare

Distribuție în aria naturală protejată: zonele semi-deschise.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A309 *Sylvia communis* - Silvie cenușie

Distribuție în aria naturală protejată: terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A311 *Sylvia atricapilla* - Silvie cu cap negru

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, deschideri din păduri, lunci, terenuri semi- deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A310 *Sylvia borin* - Silvie de grădină

Distribuție în aria naturală protejată: deschideri din păduri, liziere, lunci, terenuri semi- deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A308 *Sylvia curruca* - Silvie mică

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, deschideri din păduri, lunci, terenuri semi- deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A156 *Limosa limosa* - Sitar de mal

Distribuție în aria naturală protejată: zonele umede Dumbrăvița și Rotbav.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A364 *Carduelis carduelis* - Sticlete

Distribuție în aria naturală protejată: păduri deschise, lunci, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A285 *Turdus philomelos* - Sturz cântător

Distribuție în aria naturală protejată: păduri, deschideri din păduri, lunci, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A287 *Turdus viscivorus* - Sturz de vâsc

Distribuție în aria naturală protejată: păduri mature, deschideri din păduri, lunci, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A286 *Turdus iliacus* - Sturz de vii

Distribuție în aria naturală protejată: păduri mature, deschideri din păduri, lunci, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A099 *Falco subbuteo* - Șoimul rândunelelor

Distribuție în aria naturală protejată: păduri mature, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști, pajiști, zone umede.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A087 *Buteo buteo* - Șorecar comun

Distribuție în aria naturală protejată: păduri mature, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști, pajiști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A088 *Buteo lagopus* - Șorecar încălțat

Distribuție în aria naturală protejată: terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști, pajiști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A210 *Streptopelia turtur* - Turturică

Distribuție în aria naturală protejată: păduri mature, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști, pajiști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A086 *Accipiter nisus* - Uliu păsărar

Distribuție în aria naturală protejată: păduri mature, terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

A096 *Falco tinnunculus* - Vânturel roșu

Distribuție în aria naturală protejată: terenuri semi-deschise cu arbori și arbuști, pajiști.

Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

Hărțile de distribuție ale acestor specii de păsări de interes conservativ sunt prezentate în Anexa nr. 9 la Planul de management.

Hărțile de distribuție ale habitatelor speciilor de păsări sunt prezentate în Anexa nr. 10 la Planul de management.

2.4. Informații socio-economice, impacturi și amenințări

2.4.1. Informații socio-economice și culturale

2.4.1.1. Comunitățile locale și factorii interesați

Aria protejată ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei se află suprapusă peste unitățile administrativ-teritoriale a 9 localități, dintre care 8 comune și 1 municipiu. Astfel, din județul Brașov, fac parte localitățile: Dumbrăvița, Hălchiu, Codlea, Holbav, Feldioara, Măieruș și din județul Covasna: Hăghig și Belin. Din punct de vedere al distribuției teritoriale pe localități, situl are următoarea repartizare procentuală: Codlea - 22%, Dumbrăvița - 7%, Feldioara - 5%, Holbav - 2%, Hălchiu - 5%, Măieruș - 5%, Belin - < 1%, Hăghig - 4%.

Principalele activități ale comunităților locale sunt: agricultura și creșterea animalelor - zona rurală, serviciile, mica industrie - zona urbană, prezentate în tabelul nr. 3. Informațiile sunt preluate din datele publice ale localităților.

Tabelul nr. 3
Date privind comunitățile locale

Număr locuitori	Infrastructură utilitară			Tipuri de activități economice desfășurate
	Alimentare cu apă	Canalizare	Sistem de încălzire	
Localitatea: Municipiul Codlea				
19.000 locuitori. Tendință de scădere. Populația este relativ îmbătrânită, natalitatea scăzută.	Da	Da	Individual - gaz metan	Servicii, mica industrie Majoritatea angajaților lucrează în servicii și mica industrie.
				Agricultură O parte a terenurilor sunt cultivate, cu cerealele, sfeclă de zahăr, rapiță. Există și pășuni care sunt pășunate cu efectivele de animale locale, precum și ferme agricole.
Localitatea: Comuna Dumbrăvița				
4900 locuitori. Tendință de emigrare accentuată. Populația este relativ îmbătrânită, natalitatea scăzută.	Din fântâni și parțial din aducțiunea de apă potabilă, care are probleme de funcționare.	Nu din	Individual - lemne, gaz metan	Agricultura și creșterea animalelor O mare parte a populației locale se ocupă cu agricultura de subzistență și creșterea animalelor, deși ambele ramuri au cunoscut o diminuare semnificativă. Se cultivă: cartof, cereale. Se cresc: bovine, ovine, cabaline. Construcții, servicii Îndeosebi tinerii lucrează în proporție mare în construcții și alte servicii, în Brașov, Codlea și străinătate - Italia, Spania.
Localitatea: Satu Nou, Comuna Hălchiu				
1000 locuitori. Tendință de emigrare nu foarte accentuată.	Da	Da	Individual - lemne, gaz metan	Agricultura și creșterea animalelor Similar cu Dumbrăvița.
Localitatea: Comuna Holbav				
1280 locuitori. Tendință de emigrare nu foarte accentuată.	Nu	Nu	Individual - lemne, gaz metan	Agricultura și creșterea animalelor Similar cu Dumbrăvița.
Localitatea: Comuna Feldioara				

5700 locuitori. Tendință de emigrare nu foarte accentuată.	Da	Da	Individual - lemne, gaz metan	Agricultura și creșterea animalelor Similar cu Dumbrăvița. Servicii, mica industrie Similar cu Dumbrăvița.
Localitatea: Comuna Măieruș				
2900 locuitori. Tendință de emigrare nu foarte accentuată	Da	Da	Individual - lemne, gaz metan	Agricultura și creșterea animalelor Similar cu Dumbrăvița.
Localitatea: Comuna Belin				
1300 locuitori. Tendință de emigrare nu foarte accentuată	Nu	Nu	Individual - lemne, gaz metan	Agricultura și creșterea animalelor Similar cu Dumbrăvița.
Localitatea: Comuna Hăghig				
1700 locuitori. Tendință de emigrare nu foarte accentuată	Da	Da	Individual - lemne, gaz metan	Agricultura și creșterea animalelor Similar cu Dumbrăvița.

Estimăm ca Planul de management să aibă un impact pozitiv asupra comunităților locale, prin: scutirea de la plata impozitului pe teren, conform legislației de mediu, posibilitatea etichetării "Natura 2000" a produselor obținute în zona sitului, posibilitatea obținerii de plăți compensatorii, un grad de informare și conștientizare mai ridicat prin educarea elevilor din zonă, implicarea populației locale în diverse acțiuni, precum: cositul pajiștilor, eliminarea speciilor de plante invazive, montarea panourilor. Planul de management prin unele obiective și acțiuni contribuie la perpetuarea unor activități durabile ale comunității locale, cum este cositul anual al fânețelor și pășunarea de toamnă a pajiștilor care au fost cosite vara.

Comunitățile locale, prin activitățile durabile: cosit, pășunat cu cabaline și bovine, agricultură extensivă, contribuie la implementarea unor măsuri concrete ale planului, prin care se vizează conservarea habitatelor unor specii de păsări periclitate, cum ar fi *Crex crex* și de asemenea la menținerea pajiștilor cu floră spontană și a unor culturi de nutrețuri - lucernă, ca locuri de hrănire indispensabile pentru hrănirea unor păsări, precum: *Aquila pomarina*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Circus aeruginosus*, *Ardea alba*, *Ardea purpurea*, *Ciconia ciconia*.

Factorii interesați:

- a) proprietarii și administratorii terenurilor;
- b) administrațiile locale - primării, consilii locale, județene - consilii județene;
- c) instituțiile prefectilor din județele Brașov și Covasna;
- d) autoritățile județene pentru protecția mediului - agențiile pentru protecția mediului din Brașov și Covasna, Garda Națională de Mediu - comisariatele județene din Brașov și Covasna, Garda Forestieră;
- e) gestionarii resurselor naturale din sit: societăți comerciale, Administrația Națională "Apele Române", Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, asociațiile de vânătoare și pescuit - Asociația Județeană a Vânătorilor Sportivi Brașov, Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Doripesco, ocoalele silvice - Ocolul Silvic Codrui Cetăților Codlea, Ocolul Silvic Făgăraș;

- f)** Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură;
- g)** Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
- h)** Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură;
- i)** Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale - Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov;
- j)** Compania Națională a Căilor Ferate Române;
- k)** Electrica S.A, Transelectrica;
- l)** Universitatea Transilvania din Brașov;
- m)** inspectoratele școlare județene din Brașov și Covasna;
- n)** școlile generale din localitățile limitrofe;
- o)** organizații nonguvernamentale.

Sintetizând, s-au identificat următoarele categorii de factori interesați, prezentate în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4
Categorii de factori interesați

Nr.	Cod	Denumire factor interesat
1	FI.4	Ministere
2	FI.5	Autorități publice locale
3	FI.6	Consilii județene
4	FI.7	Primării
5	FI.8	Consilii locale
6	FI.9	Custozi
7	FI.10	Regii de profil
8	FI.11	Agenții naționale de profil
9	FI.13	Mediul academic, universitar, gimnazial
10	FI.15	Comunități rurale
11	FI.16	Organizații nonguvernamentale
12	FI.18	Secretariate ale Convențiilor internaționale - Secretariatul Convenției de la Ramsar
13	FI.22	Școlile
14	FI.24	Mass-media
15	FI.28	Societăți comerciale ce desfășoară activități - acvacultură/pescuit
16	FI.29	Societăți comerciale ce desfășoară activități comerciale sau de extracție

2.4.1.2. Utilizarea terenurilor

Efectivul piscicol este utilizat pentru piscicultură și pescuit sportiv.

Restul suprafeței este folosit pentru:

- a)** cultivarea terenului pentru culturi agricole diverse - grâu, ovăz, secară, cartofi, lucernă, floarea soarelui, porumb;
- b)** cosit, pe unele suprafețe de fânețe;
- c)** pășunat cu ovine, bovine și cabaline;

d) alte activități desfășurate în incinta sau la limita sitului, sunt cele recreative - picnicul, turismul de diferite tipuri;

e) pădurile, ca parte a fondului forestier, sunt utilizate de către administrațiile silvice atât în scopul regenerării și menținerii acestora, cât și pentru valorificarea lemnului și a altor produse accesorii.

Întreaga suprafață a sitului este inclusă în mai multe fonduri de vânătoare, utilizarea acestora în scopul vânătorii fiind parțial restricționată conform prevederilor Planului de management.

Categoriile de folosință ale terenului sunt prezentate în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5
Categoriile de folosință ale terenului

Sector arie protejată	Folosința	Suprafață - ha
Dumbrăvița	baltă	343,55
	canal	11,16
	curți construcții	1,51
	pădure	79,23
	pășune	495,76
	pășune/arbori	153,55
	teren agricol	340,75
	terenuri neproductive	0,52
	vegetație de luncă	13,48
	Total Dumbrăvița	1439,51
Măgura Coldei	baltă	2,61
	culoare pentru linii electrice	1,1
	curți construcții	35,81
	drum forestier	6,56
	linii de vânătoare și terenuri de hrană pentru vânat	11,47
	pădure	1898,08
	pășune	215,12
	pășune împădurită	1,79
	terenuri neproductive	2,41
	Total Măgura Coldei	2174,95
Rotbav	albie de râu	69,88
	areale construite	5,31
	baltă	226,75
	pășune	40,94

	pășune/arbori	138,11
	teren agricol	391,83
	vegetație de luncă	48,72
Total Rotbav		921,54
Total sit		4536

Hărțile categoriilor de folosință ale terenurilor sunt prezentate în Anexa [nr. 11](#) la Planul de management.

2.4.1.3. Situația juridică a terenurilor

Pe cuprinsul sitului, există mai multe tipuri de proprietari ai terenurilor. Se disting proprietari particulari - persoane fizice sau juridice care ocupă cea mai mare parte a terenurilor și statul român.

Sintetizând informațiile asupra proprietății terenurilor, rezultă următoarele:

a) terenurile de sub luciile de apă, albiile minore, sistemele de îmbunătățiri funciare și terenurile dintre dig-mal - proprietar statul român - proprietate publică;

b) celelalte terenuri deschise și zone umede: mlaștini, fânețe, pășuni, terenuri agricole - proprietari persoane fizice mai ales din comunitățile locale adiacente și proprietate publică a localităților;

c) pădurile - Aria Măgura Codlei - proprietar: Municipiul Codlea și comuna Holbav, Aria Dumbrăvița - proprietar: comuna Hălchiu;

d) căile de comunicație - drumuri de toate categoriile, căi ferate se află în proprietatea Statului Român și sunt administrate de diverse autorități - Compania Națională de Drumuri, consiliile județene sau locale în funcție de categoria terenului, Societatea Națională a Căilor Ferate Române.

Situația juridică a terenurilor este prezentată în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6
Situația juridică a terenurilor

Sector arie protejată	Proprietar	Suprafață - ha
Dumbrăvița	Consiliul Local al Comunei Codlea	158,71
	Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița	333,7
	Consiliul Local al Comunei Hălchiu	56,53
	persoane fizice	481,72
	persoane juridice	408,85
Total Dumbrăvița		1439,51
Măgura Coldei	Consiliul Local al Comunei Codlea	1991,89
	Consiliul Local al Comunei Holbav	78,47
	persoane fizice	104,59
Total Măgura Coldei		2174,95

Rotbav	Consiliul Local al Comunei Belin	9,46
	Consiliul Local al Comunei Feldioara	290,24
	Consiliul Local al Comunei Hăghig	53,13
	Consiliul Local al Comunei Măieruș	131,04
	persoane fizice	238,06
	persoane juridice	129,73
	statul român	69,88
Total Rotbav		921,54
Sector arie protejată	Proprietar	Suprafață - ha
Total sit		4536

Hărțile tipurilor de proprietate ale terenurilor sunt prezentate în Anexa nr. 12 la Planul de management.

2.4.1.4. Administratori și gestionari

Administrarea terenurilor se face după cum urmează:

a) părțile constructive ale barajului Dumbrăvița - Administrația Națională Apele Române, Serviciul de Gospodărire a Apelor Brașov;

b) apele curgătoare sunt administrate de Administrația Națională Apele Române;

c) sistemele de îmbunătățiri funciare de tipul canalelor, drenurilor sunt gestionate de Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare;

d) fermele piscicole Dumbrăvița și Rotbav - Vadu Roșu sunt gestionate de S.C. Doripesco S.A, prin concesiune;

e) lacurile/bălțile piscicole Rotbav și fondul piscicol al râului Olt și a afluenților - Asociația Județeană a Pescarilor Sportivi Brașov;

f) fondul forestier este administrat de Ocolul Silvic Codrui Cetăților R.A., Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Ocolul Silvic Șercaia;

g) fondul de vânătoare este gestionat de Asociația Județeană a Vânătorilor Sportivi Brașov și Asociația de Vânătoare și Pescuit Doripesco;

h) o parte a terenurilor agricole sunt arendate de către proprietari unor persoane juridice sau fizice;

i) căile de comunicație - drumuri de toate categoriile, căi ferate, sunt administrate de diverse autorități - Compania Națională de Drumuri, consiliile județene sau locale în funcție de categoria terenului, Societatea Națională a Căilor Ferate Române.

Situația administratorilor și gestionarilor terenurilor este prezentată în tabelul nr. 7.

Tabelul nr. 7
Situația administratorilor și gestionarilor

Sector arie protejată	Administrator	Suprafață - ha
Dumbrăvița	Consiliul Local al Municipiului Codlea	158,71

	Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița	333,7
	Consiliul Local al Comunei Hălchiu	56,53
	persoane fizice	481,72
	persoane juridice	408,85
Total Dumbrăvița		1439,51
Măgura Coldei	Consiliul Local al Comunei Codlea	125,8
	Consiliul Local al Comunei Holbav	2,71
	Ocolul Silvic Codrii Cetăților Codlea R.A.	1866,09
	persoane fizice	104,59
	Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Ocolul Silvic Brașov	75,76
Total Măgura Coldei		2174,95
Rotbav	Administrația Națională Apele Române	69,88
	Consiliul Local al Comunei Belin	9,46
	Consiliul Local al Comunei Feldioara	290,24
	Consiliul Local al Comunei Hăghig	53,13
	Consiliul Local al Comunei Măieruș	131,04
	persoane fizice	238,06
	persoane juridice	129,73
Total Rotbav		921,54
Total sit		4536

Hărțile tipurilor de administrare ale terenurilor sunt prezentate în Anexa [nr. 13](#) la Planul de management.

2.4.1.5. Infrastructură și construcții

În interiorul sitului există infrastructură rutieră, feroviară, rețele de joasă tensiune/electricitate, conducte de gaz.

În ce privește infrastructura rutieră, aria Măgura Codlei are parțial ca limită drumul național DN1, în rest interiorul și alte limite ale ariei fiind străbătute de drumuri forestiere sau tehnice de exploatare agricolă. Aria Dumbrăvița are parțial limita nordică suprapusă cu drumul județean DJ112C ce face legătura între Satu Nou și Dumbrăvița. Interiorul ariei prezintă o rețea de drumuri de exploatare agricolă sau forestiere. Aria Rotbav de suprapune parțial, ca limită nordică, cu drumul județean DJ103 E, care face legătura între Măieruș și Belin. Interiorul ariei prezintă o rețea de drumuri de exploatare agricolă.

Infrastructura feroviară prezintă unele suprapuneri și intersecțiuni cu limitele sitului în aria Dumbrăvița - limita vestică cu calea ferată Brașov-Sibiu înaintea haltei Dumbrăvița Bârsei și în aria Rotbav - limita vestică cu calea ferată Brașov-Târgu Mureș în zona haltelor Rotbav și Măieruș.

Rețelele aeriene de curent electric sunt doar de joasă tensiune, fiind răspândite în toate cele trei arii ale sitului.

O conductă magistrală de gaz traversează aria Dumbrăvița de la nord la sud.

Singurele construcții existente în aria Dumbrăvița sunt sediul fermei piscicole Dumbrăvița, cantonul Hamaradea al Serviciului de Gospodărire a Apelor Brașov - malul nord-estic al lacului de acumulare Dumbrăvița și câteva case particulare în intravilanul comunei Dumbrăvița.

În aria Rotbav există sediul fermei piscicole Rotbav și stația de betoane.

În aria Măgura Codlei există, în interiorul acesteia, câteva construcții ale ștrandului, unele cantoane sau alte construcții particulare - cabane, case de vacanță pe valea Geamăna, precum și clădiri ale fermelor avicole.

2.4.1.6. Patrimoniul cultural

Aspectele relevante privind patrimoniul cultural în zona sitului, sunt sintetizate în tabelul nr. 8.

Tabelul nr. 8
Patrimoniul cultural în zona sitului

Monumente istorice, culturale, arhitectura locală	Tradiții	Legende	Evenimente culturale
Localitatea: Municipiul Coldea			
Monument istoric: Ansamblul urban centrul istoric Biserica Evanghelică Incintă fortificată	Tradițiile specifice zonei - românești, săsești, secuiești	Cetatea teutonilor - Cetatea Neagră	Zilele Codlei: 8 - 15 iunie
Localitatea: Comuna Dumbrăvița			
Monument istoric: Moara veche	Tradițiile specifice zonei - românești, săsești, secuiești	Legendele apariției satului Țânțari - azi Dumbrăvița	Zilele Dumbrăviței: 18 - 20 august
Localitatea: Comuna Hălchiu			
Monument istoric: Biserica Evanghelică	Tradițiile specifice zonei - românești, săsești, secuiești		Zilele Hălchiului: 23-24 septembrie
Localitatea: Comuna Holbav			
	Tradițiile specifice zonei - românești, săsești, secuiești		Zilele Holbavului: 15-16 august
Localitatea: Comuna Feldioara			
Monument istoric: Biserica Evanghelică Cetatea	Tradițiile specifice zonei - românești, săsești, secuiești		Zilele Feldioarei: 2-4 septembrie Festivalul medieval Marienburgfest - aceeași perioadă
Localitatea: Comuna Măieruș			
Monument istoric: Biserica Evanghelică	Tradițiile specifice zonei - românești, săsești, secuiești		Sărbătoarea armizentilor de Florii Sărbătorile de iarnă - Ceata Feciorilor Zilele Măierușului: 15 august
Localitatea: Comuna Belin			

Arhitectura caselor secuiești, Biserica evanghelică	Tradițiile specifice zonei - românești, secuiești		Zilele Belinului: 30 mai Fărșangul
Localitatea: Comuna Hăghig			
Arhitectura caselor vechi	Tradițiile specifice zonei - românești, secuiești		

2.4.1.7. Obiective turistice

Obiectivul turistic principal îl constituie aria naturală protejată, principalul scop al vizitării zonei fiind reprezentat de pescuitul de agrement și observarea speciilor de păsări.

Perioada optimă de vizitare a ariei Dumbrăvița este 1 aprilie - 30 octombrie, deoarece pe perioada iernii numărul speciilor de păsări scade considerabil, iar suprafața lucilor de apă este în mare parte înghețată.

Se disting trei sub-perioade de vizitare: primăvara, pentru a surprinde speciile de pasări de pasaj care se întorc spre locurile de cuibărit nordice și a primelor păsări sosite aici pentru a cuibări în arie; vara, pentru a observa păsările cuibăritoare în arie; toamna, pentru a vedea speciile de pasaj care trec prin zonă, spre sud. Pe suprafața ariilor umede de la Dumbrăvița și Rotbav, custozii ariei protejate organizează o formă de vizitare cu scop recreativ-educativ, adresată elevilor din școlile județului Brașov și nu numai. Astfel, miniprogramul educativ este o adevărată lecție de biologie și protecția naturii în aer liber.

O a doua zonă de interes pentru practicarea birdwatching-ului o reprezintă pădurile bătrâne de pe Măgura Codlei. Aici numărul speciilor de păsări vizate este mult mai mic, acestea fiind mai greu de observat, iar terenul are un grad de dificultate mai ridicat. Cu toate acestea, mai ales pentru copii/elevi, cel puțin unul din traseele turistice marcate poate fi în viitor amenajat ca traseu tematic.

Traseul nr. 1 "Complexul piscicol Dumbrăvița"

Traseul se desfășoară integral în aria Dumbrăvița, pe următorul itinerar: de pe drumul național DN13, dinspre Brașov sau Sighișoara, spre Hălchiu - Satu Nou, apoi pe un drum agricol se ajunge la bariera ultimului heleșteu al Complexului piscicol Dumbrăvița - E12, unde este și primul punct de oprire/observație. De aici, se parcurg digurile heleșteiilor și parțial un drum agricol și se ajunge pe barajul lacului de acumulare până la deversorul acestuia și la drumul județean DJ 112 C spre comuna Dumbrăvița. Se urmează drumul județean DJ 112 C, paralel cu malul nordic al lacului de acumulare până la ultimul punct de oprire, apoi se intră în comuna Dumbrăvița. De aici, se accesează drumul național DN1 spre Brașov sau Sibiu.

Întregul traseu are un grad scăzut de dificultate.

Acesta este în totalitate accesibil pe jos și parțial cu mijloace auto.

Timpul total de desfășurare a vizitei pe acest traseu este de 2-3 ore. Desigur, în cazul observării unor specii deosebite sau a unui număr mare de specii, durata de vizitare se poate prelungi.

Vizitarea traseului se poate face în perioada 15 martie - 15 noiembrie, în funcție de condițiile meteo și de înghețul/dezghețul bazinelor acvatice. Perioada optimă de vizitare este 15 aprilie - 31 octombrie.

Traseul nr. 2 "Măgura Codlei"

Municipiul Codlea - Vf Măgura - Carieră - Drumul Carierei, triunghi roșu și cruce albastră, 4-5 ore.

Traseul se desfășoară integral în aria Măgura Codlei, pe un traseu turistic marcat: de pe drumul național DN3 din centrul Municipiului Codlea, se urmărește traseul marcat cu triunghi roșu, la început pe strada Măgurii, apoi pe alte străzi până la intrarea în pădure. Din pădure, se urmărește în continuare marcajul turistic până în vârful Măgura, apoi se va continua pe un alt marcaj, cruce albastră, spre nord și se va coborî versantul vestic până la baza acestuia, unde se va urmări un drum forestier ce ajunge la fosta carieră de piatră. De aici, se merge pe drumul forestier spre drumul național DN1, putându-se ajunge fie spre localitatea Dumbrăvița pe același marcaj turistic, fie spre Codlea și Brașov.

Traseul are un grad scăzut de dificultate pe prima porțiune, până la baza versantului abrupt, de unde devine moderat și chiar dificil pe anumite porțiuni.

Traseul este în totalitate accesibil cu piciorul.

Timpul total de desfășurare a vizitei pe acest traseu este de 4-5 ore. Desigur, în cazul observării unor specii deosebite, durata de vizitare se poate prelungi.

Vizitarea traseului se poate face tot anul, însă pentru a surprinde cât mai multe specii de păsări, perioada ideală este 1 aprilie - 30 octombrie, în funcție de condițiile meteo. Deși numărul maxim de specii este în sezonul de vegetație, observarea mai bună a păsărilor se face primăvara și toamna când arborii nu au frunze.

Hărțile celor două trasee de vizitare sunt prezentate în Anexa nr. 14 la Planul de management.

2.4.1.8. Peisajul

Fiecare din cele trei arii ale sitului are specificul său peisagistic, puternic antropizat.

Ariile Dumbrăvița și Rotbav sunt un mozaic de peisaje rurale deschise și peisaje de tip mlaștini, lacuri, ape curgătoare. Zonele umede sunt și cele mai plăcute sub aspect peisagistic, canalele, bălțile, mlaștinile, stufărișul, amintind de un peisaj "deltaic", de unde și denumirea generică a zonei umede: "Delta din Carpați".

Aria Măgura Codlei se remarcă prin peisaje forestiere și câteva deschideri de tip poiană, lizieră. Monotonia peisajului silvatic este în unele locuri întreruptă de șiruri de stânci, care împreună cu pădurile bătrâne cu arbori rupți, uscați, plini de iască, îi conferă acesteia o tentă sălbatică. Abruptul Măgurii Codlei are un caracter aparte în peisajul înconjurător, prin înălțimea sa și forma comprimată a versanților - din anumite unghiuri pare a fi un con vulcanic.

2.4.2. Impacturi

2.4.2.1. Presiuni - impacturi trecute și prezente

Presiunile au fost identificate și evaluate ca intensitate în urma studiilor efectuate în teren.

Presiunile/impacturile trecute și prezente sunt sintetizate în tabelul nr. 9, ținându-se cont de impacturile actuale și potențiale evaluate la toate speciile de păsări de interes comunitar.

Tabelul nr. 9
Presiunile/impacturile trecute și prezente

Număr curent	Codul și denumirea presiunii	Intensitatea presiunii	Localizare	Speciile sau grupul de specii pentru care este valabilă presiunea
1	K01.03. Secare	Scăzută	Întreaga zonă umedă Rotbav - lacuri, heleșteie piscicole, fostele albi ale Oltului.	Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Gavia arctica, Gavia stellata, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Porzana porzana, Porzana parva, Circus aeruginosus, Alcedo atthis, Aythya nyroca și celelalte specii de apă
2	J01.01. Incendii	Scăzută	Suprafețe mici din zona vegetației emerse de pe malul vestic al lacului de acumulare Dumbrăvița.	Ixobrychus minutus, Porzana porzana, Porzana parva, Circus aeruginosus și celelalte specii de apă
3	A02.03. Înlocuirea pășunii/fânețelor cu teren arabil	Scăzută	Zona de fânețe dintre lacul de acumulare Dumbrăvița și pâraul Holboșel - Plec și fânețele din zona malurilor sudice a heleșteielor Dumbrăvița - Grind.	Crex crex și celelalte specii de terenuri deschise
4	A03.03. Abandonarea/lipsa cositului	Scăzută	Zona de fânețe dintre lacul de acumulare Dumbrăvița și pâraul Holboșel - Plec, zona de fânețe de pe malul vestic al lacului de acumulare - Livadă, Luncă, Balta Cailor și fânețele din zona malurilor sudice a heleșteielor Dumbrăvița - Grind.	Crex crex și celelalte specii de terenuri deschise

2.4.2.2. Amenințări - impacturi viitoare previzibile

Amenințările/impacturile viitoare previzibile/potențiale sunt sintetizate în tabelul nr. 10, ținându-se cont de impacturile potențiale evaluate la toate speciile de păsări de interes comunitar.

Tabelul nr. 10
Amenințări - impacturi viitoare previzibile

Număr curent	Codul și denumirea amenințării	Intensitatea amenințării	Localizare	Speciile sau grupul de specii pentru care este valabilă amenințarea
--------------	--------------------------------	--------------------------	------------	---

1	K01.03. Secare	Medie	Întreaga zonă umedă Rotbav - lacuri, heleșteie piscicole, fostele alpii ale Oltului	Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Gavia arctica, Gavia stellata, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Porzana porzana, Porzana parva, Circus aeruginosus, Alcedo atthis, Aythya nyroca și celelalte specii de apă
2	J01.01. Incendii	Scăzută	Suprafețe mici din zona vegetației emerse de pe malul vestic al lacului de acumulare Dumbrăvița	Ixobrychus minutus, Porzana porzana, Porzana parva, Circus aeruginosus și celelalte specii de apă
3	A02.03. Înlocuirea pășunii/fânețelor cu teren arabil	Scăzută	Zona de fânețe dintre lacul de acumulare Dumbrăvița și pârâul Holboșel - Plec, fânețele din zona malurilor sudice a heleșteielor Dumbrăvița - Grind, unele fânețe din aria Rotbav	Crex crex și celelalte specii de terenuri deschise
4	A03.03. Abandonarea/lipsa cositului	Scăzută	Zona de fânețe dintre lacul de acumulare Dumbrăvița și pârâul Holboșel - Plec, zona de fânețe de pe malul vestic al lacului de acumulare - Livadă, Luncă, Balta Cailor și fânețele din zona malurilor sudice a heleșteielor Dumbrăvița - Grind	Crex crex și celelalte specii de terenuri deschise
5	F01.01. Piscicultură intensivă/intensificată	Scăzută	Zonele umede - heleșteiele piscicole din ariile Dumbrăvița și Rotbav	Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Chlidonias hybridus, Ciconia nigra, Egretta garzetta, Gavia arctica, Gavia stellata, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, Tringa glareola, Porzana parva, Circus aeruginosus, Aythya nyroca, Chlidonias niger, Ardeae alba și celelalte specii de apă
6	J02.15 Alte schimbări ale condițiilor hidraulice cauzate de activitățile umane	Medie	Zonele de mlaștini, canale și stufăriș din aria Rotbav - zona heleșteielor piscicole și a căii ferate	Ixobrychus minutus, Porzana porzana, Porzana parva, Aythya nyroca și celelalte specii de apă
7	E. Urbanizare/dezvoltare rezidențială și comercială	Scăzută	Zonele agricole din aria Dumbrăvița - Plec, Grind, Satu Nou	Ardea alba, Ciconia ciconia, Aquila pomarina, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Crex crex și celelalte specii de terenuri deschise
8	J02.05.02. Modificarea structurii cursurilor de apă continentală	Scăzută	Lunca râului Olt și a afluentului Homorodul Perșanilor/Ciucăș	Aythya nyroca, Alcedo atthis
9	C01.07. Minerit și activități de extragere	Scăzută	Întreaga zonă de stâncării și cu rocă la suprafață din aria Măgura Codlei	Falco peregrinus, Bubo bubo
10	B02. Gestionarea și utilizarea pădurilor și plantațiilor	Scăzută	Pădurile din aria Măgura Codlei și trupul de pădure Noului - aria Dumbrăvița	Strix uralensis, Picus canus, Dendrocopos medius, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva și celelalte specii de pădure
11	B02.04. Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare	Scăzută	Pădurile din aria Măgura Codlei și trupul de pădure Noului - aria Dumbrăvița	Strix uralensis, Picus canus, Dendrocopos medius, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva și celelalte specii de pădure
12	A10.01. Îndepărtarea tufișurilor	Scăzută	Zonele semi-deschise cu tufișuri din aria Dumbrăvița - Plec	Lanius collurio, Sylvia nisoria și celelalte specii de terenuri deschise

3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR

3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ

Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de pasăre de interes comunitar a fost realizată pe baza studiilor realizate în teren, luându-se în considerare și baza de date a Societății Ornitologice Române.

Sinteza evaluării stării de conservare a fiecărei specii din formularul standard al ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei inclusă în [Anexa I](#) din Directiva nr. 2009/147/CE, este redată în tabelul nr. 11.

Sinteza evaluării stării de conservare pentru cele 105 de specii de păsări, cu migrație regulată nementionate în Directiva [nr. 2009/147/CE](#), incluse în formularul standard al sitului, este prezentată în subcapitolul 2.3.5. Alte specii relevante.

Tabelul nr. 11

Sinteza evaluării stării de conservare a fiecărei specii de interes comunitar

Număr curent	Specia	Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al			
		populației	habitatului	perspectivelor speciei în viitor	globală
1	Gavia stellata	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
2	Gavia arctica	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
3	Microcarbo pygmeus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
4	Pelecanus onocrotalus	-	-	-	-
5	Botaurus stellaris	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
6	Ixobrychus minutus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
7	Nycticorax nycticorax	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
8	Egretta garzetta	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
9	Egretta alba	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
10	Ardea purpurea	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
11	Ciconia nigra	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
12	Ciconia ciconia	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
13	Plegadis falcinellus	-	-	-	-
14	Platalea leucorodia	-	-	-	-
15	Branta ruficollis	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
16	Aythya nyroca	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
17	Mergus albellus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
18	Pernis apivorus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
19	Haliaeetus albicilla	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
20	Milvus migrans	-	-	-	-
21	Circus aeruginosus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
22	Circus cyaneus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă

23	Aquila pomarina	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
24	Pandion haliaetus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
25	Falco columbarius	-	-	-	-
26	Falco peregrinus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
27	Porzana porzana	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
28	Porzana parva	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
29	Porzana pusilla	-	-	-	-
30	Crex crex	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
31	Grus grus	-	-	-	-
32	Himantopus himantopus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
33	Recurvirostra avosetta	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
34	Pluvialis apricaria	-	-	-	-
35	Philomachus pugnax	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
36	Tringa glareola	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
37	Larus melanocephalus	-	-	-	-
38	Larus minutus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
39	Gelochelidon nilotica	-	-	-	-
40	Sterna caspia	-	-	-	-
41	Sterna hirundo	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
42	Sterna albifrons	-	-	-	-
43	Chlidonias hybridus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
44	Chlidonias niger	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
45	Strix uralensis	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
46	Asio flammeus	-	-	-	-
47	Bubo bubo	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
48	Aegolius funereus	-	-	-	-
49	Alcedo atthis	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
50	Picus canus	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
51	Dryocopus martius	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
52	Dendrocopos medius	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
53	Dendrocopos leucotos	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
54	Sylvia nisoria	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
55	Ficedula albicollis	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
56	Ficedula parva	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
57	Lanius collurio	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
58	Lanius minor	-	-	-	-

Speciile fără date marcate cu "-" nu s-au mai semnalat în sit de peste 10 ani și nici cu ocazia studiilor realizate în teren în perioada 2013- 2014.

4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT

4.1. Scopul Planului de management

Scopul principal al Planului de management este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes comunitar/național din aria naturală protejată ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, precum și menținerea serviciilor ecosistemelor din sit.

4.2. Obiective generale, specifice și activități/măsuri

4.2.1. Obiective generale

Obiectivele Planului de Management sunt:

A. Asigurarea stării de conservare favorabilă pentru toate speciile de păsări de interes comunitar/național și a habitatelor acestora din sit

B. Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

C. Îmbunătățirea atitudinii populației față de valorile naturale ale sitului, prin informare, conștientizare, implicare și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii

D. Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării obiectivelor

4.2.1.1. Obiective specifice

Au fost stabilite mai multe obiective specifice, grupate în patru programe.

Programul Managementul biodiversității

Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de păsări de interes comunitar/național și a habitatelor caracteristice

Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național

Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes comunitar/național și a habitatelor acestora

Programul Vizitare, turism

Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

Programul Conștientizare și educație

Obiectiv specific 1: Conștientizarea publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

Programul Management și administrare

Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate

Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente

Obiectiv specific 3: Realizarea de instruiți, documente strategice de planificare, rapoarte adecvate

4.2.1.1.1. Activități/măsuri de conservare

Program 1. Managementul biodiversității

Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora

1. Continuarea identificării și cartării speciilor de păsări de interes comunitar/național

Se vor realiza în continuare activități de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național. Se are în vedere și identificarea/cartarea locurilor importante de cuibărit sau de concentrare: zone de hrănire, staționare diurnă, înnoptare, năpârlire, luând în considerare și criteriile de desemnare și menținere a Zonelor Umede de Importanță Internațională - Situri Ramsar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date.

Orice nouă specie de interes comunitar va fi luată în considerare.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului.

2. Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar/național

Se vor realiza în continuare activități de identificare și cartare a habitatelor speciilor de interes comunitar/național. Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau direct în baza de date electronice, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date la birou. Orice habitat nou de interes va fi luat în considerare.

Habitate vizate: toate habitatele speciilor de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național

1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de interes comunitar și a celor considerate "problemă" prin monitorizarea acestora

Activitatea se referă la monitorizarea speciilor de interes comunitar/național, conform planului de monitorizare. Monitorizarea în teren se va concentra pe specie, habitatul caracteristic și amenințări. Sunt vizate speciile de păsări cuibăritoare și necuibăritoare, iar aplicarea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului. Pe lângă speciile de de interes comunitar, vor fi în același mod monitorizate și cele care pot cauza unele dezechilibre în ecosistem - concurență la hrănire cu specii de interes comunitar, comportament agresiv față de specii sensibile de interes comunitar, răspândirea și proliferarea unor boli, sau pot cauza pierderi de producție ori de altă natură managementului piscicol ca parte integrantă a managementului sitului. Specia principală vizată în acest caz este cormoranul mare - *Phalacrocorax carbo*, însă pot să apară, în timp, și alte specii din această categorie.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului, în punctele și pe transectele de monitorizare selectate de către custode.

2. Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar/național

În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a speciilor va urma etapele standard - evaluarea din punct de vedere al suprafeței, perspectivelor speciei și evaluarea globală.

Pentru speciile "problemă" se va întocmi un capitol distinct în cadrul raportului de monitorizare.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes național/comunitar

1. Identificarea și aplicarea unor soluții hidrotehnice pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes național/comunitar

Se vor identifica și aplica soluții hidrotehnice pentru asigurarea unui debit/volum de apă suficient și constant în interiorul bazinelor acvatice din aria Rotbav - aducțiuni din Olt prin baraj gonflabil sau pompe, captarea afluenților Oltului din zonă. Măsura are în vedere asigurarea unui nivel al apei suficient în bazinele din aria Rotbav, pentru ca procesele biologice ale speciilor de păsări de interes comunitar - reproducere, hrănire, să se desfășoare în condiții normale. Este absolut necesară datorită efectelor secetelor prelungite din anii 2012 - 2013, precum și a celor istorice. Dintre soluțiile tehnice care pot asigura debitul optim în bazine, fac parte diverse tipuri de aducțiuni: conducte construite direct în albia minoră sau în acumulări de pe râul Olt, pompe, captarea unor afluenți permanenți sau temporari ai Oltului care nu se varsă direct în lacuri și heleșteie.

Specii vizate: păsări de apă - *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Aythya nyroca*, *Circus aeruginosus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Larus minutus*, *Sterna hirundo*, *Chlidonias hybridus*, *Chlidonias niger*.

Localizarea activității propuse: aria Rotbav.

2. Menținerea unui nivel al apei optim pentru regenerarea în bune condiții a vegetației de mlaștină, emerse și lemnoase și pentru siguranța reproducerii păsărilor, pe heleșteiele/bazinele unde cuibăresc, în perioada aprilie-iulie

Măsura este absolut necesară pentru a permite atât regenerarea în condiții normale a vegetației folosite ca suport pentru cuibărit, cât și oferirea unei siguranțe împotriva prădătorilor sau braconajului pentru speciile respective. Se aplică pe bazinele cele mai importante, ce dețin specii și populații cuibăritoare, cu respectarea regulilor de funcționare și siguranță a barajelor, în perioada de reproducere - 1 aprilie - 31 iulie. În mod normal, fiecare bazin piscicol are un nivel normal de retenție al apei stabilit de administratorul piscicol, care în general corespunde cu cel vizat de măsura de management. Nivelul apei din fiecare bazin depinde și de debitul natural existent la un moment dat.

Specii vizate: *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Ardea alba*, *Aythya nyroca*, *Circus aeruginosus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*.

Localizarea activității propuse: bazinele cele mai importante, ce dețin specii și populații cuibăritoare, din ariile Dumbrăvița și Rotbav: lacul de acumulare Dumbrăvăța - heleșteiele 10, 11 și 12 Dumbrăvița, 1, 4 Rotbav, lacurile/bălțile 2, 3, 4 Rotbav.

3. Vidarea heleșteielor pentru recoltarea peștelui, în perioada migrației de toamnă - august-noiembrie

Măsura este absolut necesară pentru asigurarea habitatului optim de hrănire - suprafețe de mâl și apă mică și accesibilității păsărilor pentru hrană - nevertebrate de mâl, pești mici, în perioada migrației de toamnă - august - noiembrie. Astfel, anual, toamna se realizează recoltarea peștilor din bazine prin vidarea acestora. În urma vidării apar zone cu mâl și apă mică, iar nevertebratele din mâl și peștii sălbatici de dimensiuni mici sunt ușor de capturat de către păsări. Vidarea heleșteielor este făcută anual de către administratorul fondului piscicol S. C. Doripesco S.A., ca o activitate de management piscicol. Aceasta constituie și una dintre activitățile cele mai importante din Planul de management, care a determinat marea abundență a speciilor de interes național/comunitar. Fără această activitate va fi afectată în mod drastic starea de conservare favorabilă a speciilor de păsări. Zona umedă Rotbav- Dumbrăvița a fost creată ca amenajare piscicolă și este menținută exclusiv prin activități umane cu caracter economic. Menținerea ei depinde într-o măsură foarte mare de managementul piscicol, din care face parte și această măsură. Se va colabora cu custodele ROSCI0329 Oltul Superior în vederea stabilirii măsurilor de conservare pentru speciile de pești de interes conservativ din situl ROSCI0329 Oltul Superior și a habitatelor acestora în zonele de suprapunere cu ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei.

Specii vizate: *Ardea alba*, *Egretta garzetta*, *Ciconia nigra*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Philomachus pugnax*, *Tringa glareola*.

Localizarea activității propuse: aria Dumbrăvița.

4. Sprijinirea administratorului fondului piscicol în vederea acoperirii pierderilor de producție piscicolă datorate păsărilor ihtiofage

Managementul piscicol/acvacultura, ca activitate economică de bază în zonele umede ale sitului, reprezintă o componentă obligatorie a managementului acestuia. Practic, de acest management și de interesul economic legat de el, depinde menținerea zonelor umede în actuala structură și suprafață. Una din problemele cu efectele cele mai mari asupra producției piscicole și indirect asupra managementului sitului este pierderea datorată cormoranului mare. Această specie acționează nu doar prin diminuarea semnificativă a producției piscicole, ci și prin apariția/proliferarea unor boli la pești, datorate rănilor provocate. Mai mult, cormoranul mare concurează pentru hrană cu alte specii de păsări de interes comunitar, având și un comportament agresiv cu consecințe asupra speciilor sensibile.

Custodele ariei protejate va sprijini administratorul fondului piscicol pentru accesarea unor programe de finanțare în vederea acoperirii pierderilor de producție piscicolă datorate păsărilor ihtiofage. Aceasta reprezintă modalitatea cea mai directă și eficientă de acoperire a pagubelor, fără a avea efecte asupra celorlalte specii de păsări.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes național/comunitar.

Localizarea activității propuse: amenajările piscicole din ariile Dumbrăvița și Rotbav.

5. Conservarea/menținerea suprafețelor și structurii habitatelor de mlaștină, stufăriș, rogozuri și canale din zona Rotbav - Vadu Roșu

Această măsură se va aplica pe ambele părți ale căii ferate și a canalului paralel cu digul estic al bălții 3 Rotbav.

Habitatele de zone umede din aria Rotbav - zona căii ferate, ce cuprind mlaștini cu vegetației emersă: rogozuri, stufăriș, păpuriș și canale, precum și a mlaștinii formate de canalul paralel cu digul estic al bălții 3 Rotbav, reprezintă unele din cele mai importante zone de cuibărit și hrănire pentru mai multe specii de păsări de interes comunitar din sit. Aceste habitate necesită o protecție totală atât ca suprafață existentă, cât și ca structură, mai ales în privința elementului esențial - apa de suprafață. Astfel, trebuie ca întregul habitat vizat să fie conservat ca atare, fără a se interveni cu lucrări specifice îmbunătățirilor funciare: desecări, decolmatări, adânciri de canale, eliminarea sau scăderea nivelului apei prin pompare, sau de altă natură.

Specii vizate: *Ixobrychus minutus*, *Botaurus stellaris*, *Ardea purpurea*, *Aythya nyroca*, *Circus aeruginosus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*.

Localizarea activității propuse: ambele părți ale căii ferate și a canalului paralel cu digul estic al bălții 3 Rotbav, canalele din zona Rotbav - Vadu Roșu.

6. Conservarea/menținerea suprafețelor și structurii habitatelor ripariene, inclusiv lunca cu sălcete, a pârâului Homorodul Perșanilor - Hamaradia/Ciucăș

Sectorul pârâului Homorodul Perșanilor - Hamaradia/Ciucăș situat aval de deversorul lacului de acumulare Dumbrăvița, între podețul de intrare în ferma piscicolă Doripesco și limita sitului dinspre Satu Nou, reprezintă una din cele mai importante zone de cuibărit și hrănire pentru numeroase specii de păsări de interes comunitar. Menținerea/conservarea acestui sector, respectiv a albiei minore și a luncii aferente, constă în neintervenția cu lucrări hidrotehnice sau de altă natură și astfel păstrarea structurii și suprafeței actuale a habitatului respectiv.

Specii vizate: *Alcedo atthis*, *Picus canus*, *Sylvia nisoria*.

Localizarea activității propuse: habitatele ripariene, lunca cu sălcete, a pârâului Homorodul Perșanilor - Hamaradia/Ciucăș de la podețul de acces în ferma piscicolă până la limita sitului dinspre Satu Nou.

7. Corelarea activităților/proiectelor hidrotehnice pe râul Olt, cu necesitatea conservării habitatelor ripariene și asigurarea liniștii în zonele de cuibărit, hrănire, staționare

Habitatele ripariene de pe râul Olt, inclusiv zonele cu sălcii, reprezintă suprafețe importante de cuibărit, hrănire și staționare pentru mai multe specii de păsări de interes comunitar. În cazul în care se proiectează lucrări hidrotehnice sau alte lucrări de acest tip, este necesară corelarea lor cu necesitatea conservării celor mai vulnerabile locații pentru biodiversitate, respectiv o decizie comună între autoritatea de gospodărire a apelor și specialiști ornitologi/custode.

Toate aceste activități vor fi realizate cu respectarea strictă a legislației în vigoare ținându-se cont și de statutul de arie protejată al zonei.

Custodele ariei protejate va supraveghea, în colaborare cu instituțiile abilitate, modul de desfășurare al acestor activități astfel încât acestea să se realizeze conform avizelor/autorizațiilor cu un impact cât mai redus asupra speciilor de păsări care fac obiectul protejării acestei zone.

Specii vizate: *Aythya nyroca*, *Mergus albellus*, *Tringa glareola*, *Philomachus pugnax*, *Alcedo atthis*.

Localizarea activității propuse: aria Rotbav.

8. Menținerea actualului mod de folosință a terenurilor agricole: arabil, fâneată, pășune din ariile Dumbrăvița și Rotbav

Habitatele de terenuri deschise: arabil, pășuni, fânețe reprezintă zone de cuibărit, hrănire și staționare/odihnă/înnoptare pentru mai multe specii de interes comunitar. Restrângerea suprafețelor respective sau fragmentarea lor prin diverse activități umane și proiecte imobiliare conduce la scăderea abundenței speciilor dependente de agro-ecosisteme și în final la încadrarea lor cu un statut de conservare nefavorabil. În acest fel, este necesară menținerea actualului mod de folosință al terenurilor agricole, în funcție de situația juridică a lor. Un caz aparte îl reprezintă pajiștile, care sunt protejate și de legislația specifică.

Specii vizate: *Ardea alba*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Pernis apivorus*, *Aquila pomarina*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Crex crex*, *Lanius collurio*.

Localizarea activității propuse: întregul sit.

9. Sprijinirea proprietarilor de terenuri utilizate ca pajiști, să mențină modul de folosință al acestora

Custodele va promova mecanismele de plată existente și facilitățile financiare, în funcție de prevederile legale existente și va sprijini proprietarii, prin toate mijloacele legale de care dispune pentru obținerea de scutiri de la plata impozitului pe teren, obținerea de plăți agro-mediu. Scutirea de la plata impozitului pe teren se poate aplica pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate, supuse unor restricții de utilizare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pajiștile, mai ales fânețele sunt habitate de care depind câteva specii de păsări, îndeosebi *Crex crex*. Pentru menținerea și perpetuarea acestor habitate sunt necesare măsuri privind păstrarea modului de folosință și aplicarea cosirilor anuale. În acest sens, trebuie ca proprietarii/administratorii terenurilor respective să fie stimulați pentru a aplica aceste măsuri. Cel mai realist mod este aplicarea

unor prevederi legale, precum: scutirea impozitului pe teren dacă există constrângeri, acordarea plăților pe măsuri de agro-mediu și alte asemenea compensări.

Specii vizate: *Crex crex*.

Localizarea activității propuse: terenurile utilizate ca fânețe din ariile Dumbrăvița și Rotbav.

10. Conservarea/menținerea tufișurilor izolate sau grupate din aria Dumbrăvița

Habitatele semi-deschise care cuprind terenuri agricole unde există arbuști izolați sau grupați, sunt habitatele de care depind două dintre speciile de interes comunitar. Eliminarea sau rădarea arbuștilor poate conduce la scăderea abundenței speciilor respective și în final la încadrarea lor la statutul de conservare nefavorabil. În acest sens, este necesară protejarea integrală a acestor habitate, însă în corelare cu cerințele măsurilor de agro-mediu pentru a nu se crea eventuale nerespectări ale acestora de către proprietari.

Specii vizate: *Lanius collurio*, *Sylvia nisoria*.

Localizarea activității propuse: aria Dumbrăvița.

11. Aplicarea unui management forestier favorabil speciilor de păsări de interes național/comunitar

Amenajamentele silvice de pe teritoriul sitului vor fi adaptate conform prevederilor Planului de management, astfel încât managementul forestier să fie favorabil speciilor de păsări de interes național/comunitar.

Se vor aplica următoarele măsuri, absolut necesare pentru menținerea structurii habitatului forestier, cu elementele esențiale speciilor de păsări cuibăritoare:

a) păstrarea a minimum 10 arbori/ha din categoriile: iescari, arbori scorburoși, groși, total sau parțial uscați, în funcție de situația existentă în fiecare parcelă;

b) aplicarea tăierilor de igienă cu volum minim de extras 1-3 metri cubi/an/hectar pentru parcelele/subparcelele: 71 B, 65 B, 57 B, 47 A, 46 A, 27 și 8 din Unitatea de Bază Codlea.

O parte din aceste măsuri - încadrarea la tăieri de igienă a parcelelor vizate au fost introduse în noul Amenajament Silvic al Unității de Bază Codlea, în anul 2014.

Specii vizate: *Strix uralensis*, *Dryocopus martius*, *Dendrocopos leucotos*, *Dendrocopos medius*, *Picus canus*, *Ficedula albicollis*, *Ficedula parva*.

Localizarea activității propuse: aria Măgura Codlei.

12. Conservarea/menținerea integrală a stâncăriilor din aria Măgura Codlei

Pentru conservarea habitatului tipic a două specii de păsări de interes comunitar și menținerea acestora, este necesară protejarea stâncăriilor din pădurile ariei Măgura Codlei. Aceste zone se află poziționate pe toți versanții abrupti ai măgurii, inclusiv în perimetrul fostei cariere de calcar din partea sa nordică.

În aceste zone nu vor fi realizate lucrări silvice și nu se va realiza exploatarea stâncăriilor.

De asemenea, zonele de cuibărit vor fi supravegheate în cursul activităților de patrulare.

Specii vizate: Falco peregrinus, Bubo bubo.

Localizarea activității propuse: aria Măgura Codlei.

13. Realizarea unui management eficient al deșeurilor în sit

Se vor face demersuri pentru instalarea și menținerea unor facilități de depozitare și transport al deșeurilor.

De asemenea se vor realiza activități de patrulare și controale în zonele vulnerabile.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate.

14. Implementarea măsurilor de conservare din planul de management și a altora noi, în funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar

Custodele ariei protejate va implementa măsurile de conservare recomandate anterior dar va implementa și alte măsuri noi, în funcție de rezultatele monitorizărilor.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate.

Program 2. Vizitare, turism

Obiectiv specific 1: Promovarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

1. Elaborarea unui ghid de vizitare al sitului

Având în vedere practicarea mai multor tipuri de turism sau recreere în interiorul sitului și posibilitatea afectării unor specii prin astfel de activități umane, este necesară elaborarea unui ghid privind vizitarea și practicarea turismului în sit, pe baza prevederilor Planului de management și a regulamentului ariei protejate.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate.

2. Proiectarea și amenajarea infrastructurii minime de vizitare

Pentru practicarea unor forme de turism de nișă și vizitării organizate a sitului, sunt necesare amenajări minime de infrastructură în acest sens. S-a considerat a fi necesară selectarea a câte unui traseu de vizitare pentru fiecare din cele trei arii. Traseul de vizitare va fi unul tematic și va necesita o minimă amenajare, astfel:

a) panouri informative specifice - minimum 2 panouri/traseu;

b) turnuri de observație - minimum 2 turnuri în aria Dumbrăvița și 2 turnuri în aria Rotbav;

c) zone de popas/odihnă sau refugiu pentru vizitatori - minimum 2 locații/arie, cu masă/bănci de lemn, umbrele de stuf;

d) toalete ecologice - minimum 1 toaletă/arie.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate.

Program 3. Conștientizare și educație

Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

1. Întâlniri cu comunitățile locale și alți factori de interes privind managementul sitului

Plecând de la ideea că populația locală reprezintă actorul principal al conservării și managementului sitului, una din modalitățile de informare, conștientizare, consultare și implicare o reprezintă discuțiile deschise pe diverse teme de interes, cu grupuri de proprietari, administratori de terenuri, reprezentanți ai autorităților locale sau altor factori de interes. Se propune organizarea a minimum o întâlnire pe an, însă dacă există interes și este necesar, numărul discuțiilor organizate poate fi mai mare. Este vizat întregul sit, cu toate comunitățile locale și interesele socio-economice ce interferează cu situl.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe ariei protejate.

2. Diseminarea publicațiilor despre sit: pliant, broșură

Publicațiile privind situl, realizate prin intermediul diferitelor proiecte vor fi diseminate cu diverse ocazii organizate: întâlniri, manifestări cu prilejul unor evenimente privind protecția mediului și a naturii, atât comunităților locale și autorităților, cât și turiștilor și altor persoane care au contact cu situl. Publicațiile constau în principal în pliante, o broșură de prezentare a sitului și ghidul vizitatorului.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe ariei protejate.

3. Promovarea ariei naturale protejate pe pagina web a custodelui, pe diverse medii de socializare online

Administrarea paginii web a sitului, precum și a conturilor de socializare - Delta din Carpați și Delta din Carpați Doripesco se va realiza împreună cu partenerii.

Cele trei site-uri/conturi de socializare destinate prezentării sitului și activităților de management din acesta, vor fi administrate continuu, fiind platforme online cu un important rol de conștientizare a publicului larg.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: cu referire la întreaga suprafață a sitului.

4. Proiectarea și montarea panourilor informative și de avertizare

O altă modalitate de informare și conștientizare privind existența, importanța și necesitatea conservării sitului, este amplasarea de panouri informative în punctele de acces cele mai frecventate de public la nivelul sitului. Se are în vedere realizarea și montarea a minimum două panouri informative/arie - în total minimum 6 panouri.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului.

5. Promovarea ariei protejate și a acțiunilor de management în mass - media

Situl, activitățile de management și alte aspecte care vizează aria naturală protejată vor fi promovate și făcute publice prin intermediul mass-media, atât a celei scrise, cât și a celei televizate. Acțiunea este continuă.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: cu referire la întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

1. Tipărirea și diseminarea ghidului educativ în școlile localităților limitrofe sitului

Ghidul educativ destinat elevilor, realizat prin proiectul POS Mediu, va fi reeditat și diseminat în toate școlile localităților limitrofe sitului, dar și elevilor din alte școli ale județelor Brașov și Covasna, care participă la acțiuni/activități desfășurate în sit. Ghidul va fi împărțit copiilor cu diverse ocazii, precum manifestările dedicate unor zile tematice: 1 aprilie - Ziua Păsărilor, 2 februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede, sau la ieșirile în teren organizate de custozi. Concomitent, se vor disemina și alte materiale de profil - pliante, postere având ca subiect păsările, protecția naturii și ariile protejate, ce se vor adresa nu doar copiilor, ci și învățătorilor și profesorilor ce însoțesc grupurile de elevi.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: toate școlile din localitățile limitrofe ariei protejate.

2. Prezentări tematice în școlile din localitățile limitrofe sitului

O altă modalitate de educație ecologică a copiilor în spiritul protejării avifaunei și naturii în general, este realizarea unor prezentări tematice în școli. Astfel, sunt programate minimum 2 prezentări anual cu ocazia unor zile tematice, precum: Ziua Mondială a Zonelor Umede, Ziua Păsărilor, Ziua Observării Păsărilor. Cu aceste ocazii vor fi diseminate și diverse materiale publicate.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: toate școlile din localitățile limitrofe ariei protejate.

3. Promovarea programului educativ-recreativ pentru copii - Delta din Carpați Doripesco

Una din activitățile educative desfășurate în sit și organizate de unul dintre custozi - S. C. Doripesco S.A, este programul educativ "Delta din Carpați Doripesco". Acesta se desfășoară pe teren în două arii ale sitului - Dumbrăvița și Rotbav. Programul constă dintr-un tur organizat pentru grupuri de elevi, cu oprire în aria Dumbrăvița unde se prezintă păsările și aspecte legate de aria naturală protejată cu ajutorul unui ghid ornitolog și un al doilea punct la Rotbav, unde copiii învață despre pești și pot pescui responsabil/sustenabil în stilul 'prinde și eliberează'. Această ieșire în teren implică atât o parte educativă interactivă, cât și una recreativă desfășurată în mijlocul naturii. Programul poate fi îmbunătățit și extins nu doar la școlile din județele peste care se suprapune situl, ci chiar la scară națională. Poate de asemenea, să fie

considerat un model de program educativ interactiv în natură și preluat de S. C. către alte administrații de arii protejate.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: toate școlile din localitățile limitrofe ariei protejate, ariile Dumbrăvița și Rotbav ale sitului.

Program 4. Management și administrare

Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate

1. Realizare/echipare punct de lucru custode

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

2. Materializarea limitelor ariei protejate pe teren și menținerea acestora

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

3. Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare și a panourilor informative pentru evidențierea limitelor sitului

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

4. Asigurarea de dotări și echipament de teren adecvat

Activitatea are un caracter direct protectiv pentru sit, prin patrulări efectuate în vederea prevenirii unor probleme/amenințări în sit. În acțiunile de patrulare și pază este implicat personalul custodelui, dar și voluntari. Pentru ca astfel de acțiuni să fie eficiente, trebuie asigurat echipamentul necesar, format din mijloace auto, binocluri, night-vision, echipamente GPS și altele asemenea.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

5. Asigurarea de echipament de birou adecvat

Se vor achiziționa echipamente necesare bunei funcționări a echipei custodelui: calculatoare, imprimantă, soft-uri cu licență și altele asemenea.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente

1. Adaptarea organigramei custodelui la necesitățile de aplicare ale Planului de management

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

2. Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul sitului

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

3. Desfășurarea și participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe

Pentru ca administrarea și managementul sitului să fie eficiente este necesar ca anual să se organizeze instruirii cu personalul implicat. Temele de instruire sunt în principal legate de administrarea propriu-zisă și de acțiunile

din Planul de management, punându-se accent pe acțiunile de pază și patrulare, de monitorizare. Instruirile vor fi făcute și în funcție de anumite situații concrete care impun acest lucru. În fiecare an se va concepe un raport de instruire în funcție de temele discutate.

De asemenea, pregătirea personalului în vederea recunoașterii în teren a populațiilor speciilor de interes comunitar și a habitatelor acestora este imperios necesară.

Cunoașterea speciilor de interes conservativ, a habitatelor acestora și a localizării acestora în teren de către angajații custodelui și partenerii pentru implementarea Planului de management este obligatorie pentru implementarea eficientă a măsurilor de conservare care vizează aceste elemente.

Această activitate va fi realizată la începutul implementării Planului de management de către toți angajații custodelui, sub îndrumarea specialiștilor.

Fiecare angajat nou al ariei protejate va fi instruit pentru a putea recunoaște speciile de interes conservativ.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 3: Realizarea și coordonarea eficientă a activităților administrative

1. Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării

Custodele va realiza la începutul fiecărui an, un plan de lucru în care se vor detalia măsurile de management care vor trebui aplicate, zonele în care vor fi aplicate, resursele umane și resursele financiare alocate.

Acest plan de lucru va reprezenta de fapt o detaliere a măsurilor din Planul de management.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

2. Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

3. Trimiterea și completarea rapoartelor în funcție de solicitările autorităților

Custodele raportează activitatea de custodie către autoritatea de protecția mediului, sub forma raportului anual de exercitare a custodiei. Prin acest raport se prezintă toate aspectele relevante de la nivelul sitului și în final starea ariei protejate. De asemenea, se pot întocmi și alte tipuri de rapoarte sau baze de date solicitate de autoritate. Acțiunea are în vedere întregul sit.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

4. Monitorizarea implementării Planului de management

Măsurile/activitățile Planului de management necesită a fi monitorizate în vederea asigurării îndeplinirii lor. Fiecare măsură/activitate în parte se va monitoriza după aplicare, prin verificarea indicatorilor specifici de realizare. Eventual pot fi utilizate și alte modalități ce iau în considerare nu doar rezultatele unei singure măsuri, ci a mai multora care sunt conectate între ele sau a căror feed-backuri reiese doar prin însumarea îndeplinirii lor.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

5. Identificare și accesare surse de finanțare

Una din cele mai importante măsuri privind acoperirea unor cheltuieli administrative și de management ale sitului, este atragerea de fonduri prin diverse programe/proiecte. Este necesară identificarea surselor de finanțare ce pot fi utile în acest sens și completarea cererilor de finanțare. O abordare eficientă este să fie luat în considerare orice tip de finanțare ce poate rezolva sau facilita activitățile/măsurile din proiect, fie considerate separat, fie grupate pe diverse obiective specifice.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

6. Realizarea de patrulare periodice pe teritoriul sitului

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

7. Eliberarea de avize - negative/pozitive/cu restricții pentru planurile și proiectele care se realizează pe teritoriul sitului

Custodele va evalua impactul planurilor și proiectelor propuse a fi realizate pe teritoriul sitului prin studierea deocuminației depuse de către solicitanți și pe baza observațiilor din teren.

În urma evaluării custodele va elibera avize - negative/pozitive/cu restricții.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

8. Actualizarea permanentă a bazei de date

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

9. Evaluarea rezultatelor implementării Planului de management în al V-lea an și întocmirea noului plan

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

5. PLANUL DE ACTIVITĂȚI

5.1. Acțiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor

Acțiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor, prioritizarea acestora, partenerii de implementare precum și durata și periodicitatea acțiunilor sunt prezentate în tabelul nr. 12.

Prioritatea 1: Se atribuie acțiunilor care trebuie să se desfășoare în perioada de implementare a Planului de management; nu există nici o scuză pentru eșec.

Prioritatea 2: Acțiuni ce ar trebui finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o explicație serioasă dacă nu vor fi realizate.

Prioritatea 3: Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp și/sau resurse.

Tabelul nr. 12

Acțiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor: indicatori, prioritate, programare, parteneri

Acțiuni/măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Program 1. Managementul biodiversității														
Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora														
1.1.1. Continuarea identificării și cartării speciilor de păsări de interes comunitar/național	Un raport anual privind identificarea speciilor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone.	2												Specialiști în institute de cerc
1.1.2. Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar/național	Un raport anual privind identificarea habitatelor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone.	2												Specialiști în institute de cerc
Program 1. Managementul biodiversității														
Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național														
1.2.1. Actualizarea permanentă a informațiilor	Un set de informații actualizate - raport anual	1												Specialiști în institute de cerc

Acțiuni/măsurile	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
privind speciile de interes comunitar/național și a celor considerate „problemă” prin monitorizarea acestora	privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar și a celor considerate „problemă” ce au impact negativ pentru managementul sitului.												
1.2.2. Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național	Un raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar.	1											Specialiști în institute de cerc
Program 1. Managementul biodiversității													
Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes național/comu													
1.3.1. Identificarea și aplicarea unor soluții hidrotehnice pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a	Număr de soluții hidrotehnice identificate și aplicate în teren.	1											S.C. Doripes Administrația Olt, agenții pentru mediului,

Acțiuni/măsuri	Indicatori de realizare	Priori tate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
speciilor de păsări de interes național/comunitar														Națională de comisariate autorități administrației locale
1.3.2. Menținerea unui nivel al apei optim pentru regenerarea în bune condiții a vegetației de mlaștină, emerse și lemnoase și pentru siguranța reproducerii păsărilor, pe heleșteiele/bazinele unde cuibăresc, în perioada aprilie-iulie	Număr de heleșteie și bazine cu nivel optim de apă în perioada aprilie-iulie.	1												S.C. Doripesc agenții județene protecția Garda Națională Mediu - co regionale, auto administrației locale
1.3.3. Vidarea heleșteielor pentru recoltarea peștelui, în perioada migrației de	Număr de heleșteie vidate în perioada migrației de toamnă -	1												S.C. Doripesc agenții județene protecția

Acțiuni/măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri și implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
toamnă - august-noiembrie	august-noiembrie.													Garda Națională Mediu - comunitar regionale, autorități administrației locale
1.3.4. Sprijinirea administratorului fondului piscicol în vederea acoperirii pierderilor de producție piscicolă datorate păsărilor ihtiofage	Număr de acțiuni de acțiuni de sprijinire a administratorului fondului piscicol.	3												S.C. Doripesc agenții județene protecția Garda Națională Mediu - comunitar regionale, autorități administrației locale
1.3.5. Conservarea/ menținerea suprafețelor și structurii habitatelor de mlaștină, stufăriș, rogozuri și canale din zona Rotbav -	Număr de hectare pe care au fost conservate/menținute suprafețele și structura habitatelor de mlaștină,	1												Agencia Națională Îmbunătățiri agenții județene protecția Garda Națională

Acțiuni/măsuri	Indicatori de realizare	Priori tate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Vadu Roșu	stufăriș, rogozuri și canale din zona Rotbav - Vadu Roșu.												Mediu - co regionale, auto administrației locale
1.3.6. Conservarea/ menținerea suprafețelor și structurii habitatelor ripariene, inclusiv lunca cu sâlcete, a pârâului Homorodul Perșanilor - Hamaradia/Ciucaș	Număr de hectare pe care au fost conservate/menținute suprafețele și structura habitatelor ripariene, inclusiv lunca cu sâlcete, a pârâului Homorodul Perșanilor - Hamaradia/Ciucaș.	1											Administrația Olt, agenții pentru mediului, Națională de comisariate autorități administrației locale
1.3.7. Corelarea activităților/ proiectelor hidrotehnice pe râul Olt cu necesitatea conservării habitatelor ripariene și	Numărul de activități/proiecte hidrotehnice pe râul Olt corelate cu necesitatea conservării habitatelor	1											Administrația Olt, S.C. Dorip agenții județen protecția Garda Națio

Acțiuni/măsură	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
asigurarea liniștii în zonele de cuibărit, hrănire, staționare	riparene și asigurarea liniștii în zonele de cuibărit, hrănire, staționare.												Mediu - co regionale, auto administrației locale
1.3.8. Menținerea actualului mod de folosință al terenurilor agricole: arabil, fâneață, pășune, din ariile Dumbrăvița și Rotbav	Numărul de hectare pe care s-a menținut modul actual de folosință al terenurilor agricole.	1											Autorități administrației locale, proprietari/adm teren agricol, județene pentru mediului, Națională de comisariate regi
1.3.9. Sprijinirea proprietarilor de terenuri utilizate ca păștiți, să mențină modul de folosință al acestora	Numărul de hectare de păștiți cu folosință menținută; numărul de acțiuni de sprijinire a proprietarilor de păștiți	1											Autorități administrației locale, propri terenuri, Agenți și Interven

Acțiuni/măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
	întreprinse de custode.													Agricultură
1.3.10. Conservarea/ menținerea tufişurilor izolate sau grupate din aria Dumbrăvița	Numărul de tufişuri izolate sau grupate din aria Dumbrăvița conservate.	1												Proprietari de agenții județene protecția Garda Națio Mediu - c regionale, aut administrației locale
1.3.11. Aplicarea unui management forestier favorabil speciilor de păsări de interes național/comunitar	Număr de amenajamente slvice adaptate conform prevederilor Planului de management; numărul de măsuri silvice pentru menținerea structurii habitatului forestier, cu elementele esențiale speciilor de păsări	1												Ocolul Silvic Cetăților proprietari de agenții județene protecția Garda Națio Mediu - c regionale, aut administrației

Acțiuni/măsură	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
	cuibăritoare aplicate în teren.												locale,
1.3.12. Conservarea/ menținerea integrală a stâncăriilor din aria Măgura Codlei	Număr de hectare de stâncării din aria Măgura Codlei conservate.	1											Proprietari t Primăria Co Holbav, agenții pentru mediului, Națională de comisariate n autorități administrației locale
1.3.13. Realizarea unui management eficient al deșeurilor în sit	Număr de demersuri realizate de custode; numărul de facilități de depozitare și transport al deșeurilor realizate și menținute.	1											Proprietari de agenții județen protecția Garda Naționa Mediu - co regionale, auto

Acțiuni/măsurile	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Partenerii implicați în implementare
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
													administrației locale
1.3.14. Implementarea măsurilor de conservare din planul de management și a altora noi, în funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar	Număr de măsuri de conservare implementate.	1											Administrația Olt, S.C. Dorip agenții județene de protecția Garda Națională Mediu - comunitar regionale, autoritățile administrației locale
Program 2. Vizitare, turism													
Obiectiv specific 1: Promovarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului													
2.1.1. Elaborarea unui ghid de vizitare al sitului	Ghid elaborat.	2											Autorități administrației locale, asociații de turism, proprietari, administratori

Acțiuni/măsur	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
													terenuri
2.1.2. Proiectarea și amenajarea infrastructurii minime de vizitare	Număr de panouri informative montate în teren; număr de turnuri de observație montate în teren; număr de zone de popas/odihnă sau refugiu pentru vizitatori amenajate în teren; număr de toalete ecologice montate în teren.	2											Autorități administrației locale, asociații turism, proprietari administratori terenuri, proprietari structuri turistice cazare
Program 3. Conștientizare și educație													
Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului													
3.1.1. <u>Întâlniri</u> cu comunitățile locale și alți factori de interes privind managementul sitului	Număr de întâlniri anuale.	1											Autorități administrației locale, asociații de turism, p

Acțiuni/măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
														terenuri
3.1.2. Diseminarea publicațiilor despre sit: pliant, broșură	Număr de publicații diseminate.	2												Autorități administrației locale, asocia de turism, prop administrator te
3.1.3. Promovarea ariei naturale protejate pe pagina web a custodelui, pe diverse medii de socializare online	Număr de pagini web/conturi de socializare care prezintă informații despre aria protejată; numărul anual de informații actualizate.	2												Specialiști în do
3.1.4. Proiectarea și montarea panourilor informative și de avertizare	Număr de panouri montate în teren.	2												Autorități administrației locale, asocia de turism, prop administrator te
3.1.5. Promovarea ariei	Număr de articole în	2												Mass-media,

Acțiuni/măsur	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
protejate și a acțiunilor de management în mass - media	presă, emisiuni de televiziune.													ale administrație locale, asocia de turism, prop administrator te
Program 3. Conștientizare și educație														
Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului														
3.2.1. Tipărirea și diseminarea ghidului educativ în școlile localităților limitrofe sitului	Număr de ghiduri tipărite și diseminate în școli.	2												Autorități administrației locale, profes școli, ins școlare județene
3.2.2. Prezentări tematice în școlile din localitățile limitrofe sitului	Număr de prezentări anuale.	2												Autorități administrației locale, profes școli, ins școlare județene
3.2.3. Promovarea programului educativ-	Număr de grupuri de elevi implicate în	1												S.C. Doripesc autorități

Acțiuni/măsurile	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
recreativ pentru copii - Delta din Carpați Doripesco	program/an.												administrației locale, profes școli, ins școlare județene
Program 4. Management și administrare													
Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate													
4.1.1. Realizare/echipare punct de lucru custode	Punct de lucru realizat și echipat.	2											Autorități administrației locale, opera turism, producă
4.1.2. Materializarea limitelor ariei protejate pe teren și menținerea acestora	Limitele ariei protejate materializate și menținute în teren.	1											Autorități administrației locale, propri terenuri
4.1.3. Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare și a panourilor	Număr de panouri indicatoare, panouri de avertizare și panouri informative, existente în	1											Autorități administrației locale, propri terenuri

Acțiuni/măsură	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
informative pentru evidențierea limitelor sitului	teren.												
4.1.4. Asigurarea de dotări și echipament de teren adecvat	Număr de echipamente de teren existente.	1											-
4.1.5. Asigurarea de echipament de birou adecvat	Număr de echipamente de teren existente.	1											-
Program 4. Management și administrare													
Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente													
4.2.1. Adaptarea organigramei custodelui la necesitățile de aplicare ale Planului de management	Organigramă adaptată la necesitățile de aplicare ale Planului de management.	1											
4.2.2. Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul sitului.	Un raport anual de privind necesarul de instruire.	1											-
4.2.3. Desfășurarea și	Număr de cursuri de												Specialiști în do

Acțiuni/măsură	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe	instruire; numărul de activități de schimb de experiență; numărul de conferințe.	2											
Program 4 Management și administrare													
Obiectiv specific 3: Realizarea și coordonarea eficientă a activităților administrative													
4.3.1. Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării	Un plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării elaborat	1											-
4.3.2. Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare	Număr de rapoarte de activitate și financiare elaborate.	1											-
4.3.3. Trimiterea și completarea rapoartelor în funcție de solicitările autorităților	Număr de rapoarte elaborate.	1											-
4.3.4. Monitorizarea implementării Planului de	Număr de acțiuni din Planul de management	1											-

Acțiuni/măsur	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
management	realizate.												
4.3.5. Identificare și accesare surse de finanțare	Număr de proiecte depuse spre finanțare; numărul de proiecte aprobate pentru finanțare.	1											Specialiști în d
4.3.6. Realizarea de patrul periodice pe teritoriul sitului	Număr de acțiuni de patrulare; rapoarte de patrulare.	1											Poliție Locală, Garda Națio Mediu - co regionale, Ins Județean al Poli
4.3.7. Eliberarea de avize - negative/pozitive/cu restricții pentru planurile și proiectele care se realizează pe teritoriul sitului	Număr de avize eliberate.	1											-
4.3.8. Actualizarea permanentă a bazei de date	Număr de actualizări ale bazei de date.	1											-
4.3.9. Evaluarea rezultatelor	Un raport final de												-

Acțiuni/măsur	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri p implemen	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
implementării planului de management în al V-lea an și întocmirea noului plan	activitate; un Plan de management revizuit.	1												

5.2. Resurse umane, resurse financiare necesare implementării planului de management

În baza activităților și măsurilor de management propuse pentru implementarea planului de management, ținând cont de priorități și de țintele - indicatorii propuși, a fost estimată resursa umană precum și resursa financiară necesară implementării planului, la nivel de acțiuni, suprograme și programe. Costurile estimate depășesc cu mult resursele disponibile, fiind necesară

atragera de finanțări precum și asigurarea de resurse financiare din bugetul autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate pentru implementarea planului de management.

Resursele umane necesare implementării planului de management vor fi gestionate de custode.

Costurile implementării planului de management au fost calculate luând în considerare o resursă umană de două persoane/activitate pentru scenariul "minim pentru implementare plan" sau patru persoane/activitate pentru scenariul "implementare optimă plan", conform metodologiei utilizate, prezentate la Capitolul 7. Bibliografie.

După necesități custodele va putea angaja sau semna contracte de colaborare, în condițiile legii, în vederea acoperirii necesarului de personal.

Numărul total de zile alocate/persoană pentru realizarea activităților sunt prezentate în Anexa nr. 1 la Planul de management - angajament bugetar.

Costurile de implementare pentru fiecare activitate vor fi defalcate în planul de lucru anual, care va fi realizat de custode, în funcție de necesități.

Resursele materiale necesare pentru implementarea planului de management sunt prezentate în subcapitolul 4.2.1.1.1. Activități, măsuri de management în cadrul programului 4. Management și administrare.

De asemenea, resursele materiale necesare vor fi detaliate în planul de lucru anual, care va fi realizat de custode, în funcție de necesități.

6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR

Tabelul nr. 13
Planul de monitorizare a activităților

Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective și activități	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător		
	Correspondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
Continuarea identificării și cartării speciilor de păsări de interes comunitar/național	1.1.1.	C	Un raport anual privind identificarea speciilor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone.
Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar/național	1.1.2.	C	Un raport anual privind identificarea habitatelor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone.
Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de interes comunitar/național și a celor considerate "problemă" prin monitorizarea acestora	1.2.1.	C	Un set de informații actualizate - raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar și a celor considerate "problemă" ce au impact negativ pentru managementul sitului.
Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național	1.2.2.	P	Un raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar.

Identificarea și aplicarea unor soluții hidrotehnice pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes național/comunitar	1.3.1.	C	Număr de soluții hidrotehnice identificate și aplicate în teren.
Menținerea unui nivel al apei optim pentru regenerarea în bune condiții a vegetației de mlaștină, emerse și lemnoase și pentru siguranța reproducerii păsărilor, pe heleșteiele/bazinele unde cuibăresc, în perioada aprilie- iulie	1.3.2.	C	Număr de heleșteie și bazine cu nivel optim de apă în perioada aprilie- iulie.
Vidarea heleșteielor pentru recoltarea peștelui, în perioada migrației de toamnă - august-noiembrie	1.3.3.	C	Număr de heleșteie vidate în perioada migrației de toamnă - august- noiembrie.
Sprrijinirea administratorului fondului piscicol în vederea acoperirii pierderilor de producție piscicolă datorate păsărilor ihtiofage	1.3.4.	C	Număr de acțiuni de acțiuni de sprijinire a administratorului fondului piscicol.
Conservarea/ menținerea suprafețelor și structurii habitatelor de mlaștină, stufăriș, rogozuri și canale din zona Rotbav - Vadu Roșu	1.3.5.	C	Număr de hectare pe care au fost conservate/menținute suprafețele și structura habitatelor de mlaștină, stufăriș, rogozuri și canale din zona Rotbav - Vadu Roșu.
Conservarea/ menținerea suprafețelor și structurii habitatelor ripariene, inclusiv lunca cu sălcete, a pârâului Homorodul Perșanilor - Hamaradia/Ciucăș	1.3.6.	C	Număr de hectare pe care au fost conservate/menținute suprafețele și structura habitatelor ripariene, inclusiv lunca cu sălcete, a pârâului Homorodul Perșanilor - Hamaradia/Ciucăș.
Corelarea activităților/ proiectelor hidrotehnice pe râul Olt cu necesitatea conservării habitatelor ripariene și asigurarea liniștii în zonele de cuibărit, hrănire, staționare	1.3.7.	C	Numărul de activități/proiecte hidrotehnice pe râul Olt corelate cu necesitatea conservării habitatelor ripariene și asigurarea liniștii în zonele de cuibărit, hrănire, staționare.
Menținerea actualului mod de folosință al terenurilor agricole: arabil, fâneată, pășune, din ariile Dumbrăvița și Rotbav	1.3.8.	C	Numărul de hectare pe care s-a menținut modul actual de folosință al terenurilor agricole.
Sprrijinirea proprietarilor de terenuri utilizate ca pajiști, să mențină modul de folosință al acestora	1.3.9.	C	Numărul de hectare de pajiști cu folosință menținută; numărul de acțiuni de sprijinire a proprietarilor de pajiști întreprinse de custode.
Conservarea/ menținerea tufișurilor izolate sau grupate din aria Dumbrăvița	1.3.10.	C	Numărul de tufișuri izolate sau grupate din aria Dumbrăvița conservate.
Aplicarea unui management forestier favorabil speciilor de păsări de interes național/comunitar	1.3.11.	C	Număr de amenajamente silvice adaptate conform prevederilor Planului de management; numărul de măsuri silvice pentru menținerea structurii habitatului forestier, cu elementele esențiale speciilor de păsări cuibăritoare aplicate în

			teren.
Conservarea/menținerea integrală a stâncărilor din aria Măgura Codlei	1.3.12.	C	Număr de hectare de stâncării din aria Măgura Codlei conservate.
Realizarea unui management eficient al deșeurilor în sit	1.3.13.	C	Număr de demersuri realizate de custode; numărul de facilități de depozitare și transport al deșeurilor realizate și menținute.
Implementarea măsurilor de conservare din planul de management și a altora noi, în funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar	1.3.14.	C	Număr de măsuri de conservare implementate.
Elaborarea unui ghid de vizitare al sitului	2.1.1.	N	Ghid elaborat.
Proiectarea și amenajarea infrastructurii minime de vizitare	2.1.2.	N	Număr de panouri informative montate în teren; număr de turnuri de observație montate în teren; număr de zone de popas/odihnă sau refugiu pentru vizitatori amenajate în teren; număr de toalete ecologice montate în teren.
Întâlniri cu comunitățile locale și alți factori de interes privind managementul sitului	3.1.1.	P	Număr de întâlniri anuale.
Diseminarea publicațiilor despre sit: pliant, broșură	3.1.2.	N	Număr de publicații diseminate.
Promovarea ariei naturale protejate pe pagina web a custodelui, pe diverse medii de socializare online	3.1.3.		Număr de pagini web/conturi de socializare care prezintă informații despre aria protejată; numărul anual de informații actualizate.
Proiectarea și montarea panourilor informative și de avertizare	3.1.4.	N	Număr de panouri montate în teren.
Promovarea ariei protejate și a acțiunilor de management în mass - media	3.1.5.	N	Număr de articole în presă, emisiuni de televiziune.
Tipărirea și diseminarea ghidului educativ în școlile localităților limitrofe sitului	3.2.1.	N	Număr de ghiduri tipărite și diseminate în școli.
Prezentări tematice în școlile din localitățile limitrofe sitului	3.2.2.	P	Număr de prezentări anuale.
Promovarea programului educativ-recreativ pentru copii - Delta din Carpați Doripesco	3.2.3.	P	Număr de grupuri de elevi implicate în program/an.
Realizare/echipare punct de lucru custode	4.1.1.	N	Punct de lucru realizat și echipat.

Materializarea limitelor ariei protejate pe teren și menținerea acestora	4.1.2.	C	Limitele ariei protejate materializate și menținute în teren.
Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare și a panourilor informative pentru evidențierea limitelor sitului	4.1.3.	N	Număr de panouri indicatoare, panouri de avertizare și panouri informative, existente în teren.
Asigurarea de dotări și echipament de teren adecvat	4.1.4.	N	Număr de echipamente de teren existente.
Asigurarea de echipament de birou adecvat	4.1.5.	N	Număr de echipamente de teren existente.
Adaptarea organigramei custodelui la necesitățile de aplicare ale Planului de management	4.2.1.	N	Organigramă adaptată la necesitățile de aplicare ale Planului de management.
Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul sitului.	4.2.2.	N	Un raport anual de privind necesarul de instruire.
Desfășurarea și participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe	4.2.3.	N	Număr de cursuri de instruire; numărul de activități de schimb de experiență; numărul de conferințe.
Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării	4.3.1.	P	Un plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării elaborat
Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare	4.3.2.	P	Număr de rapoarte de activitate și financiare elaborate.
Trimiterea și completarea rapoartelor în funcție de solicitările autorităților	4.3.3.	N	Număr de rapoarte elaborate.
Monitorizarea implementării Planului de management	4.3.4.	P	Număr de acțiuni din Planul de management realizate.
Identificare și accesare surse de finanțare	4.3.5.	N	Număr de proiecte depuse spre finanțare; numărul de proiecte aprobate pentru finanțare.
Realizarea de patrulare periodice pe teritoriul sitului	4.3.6.	C	Număr de acțiuni de patrulare; rapoarte de patrulare.
Eliberarea de avize - negative/pozitive/cu restricții pentru planurile și proiectele care se realizează pe teritoriul sitului	4.3.7.	N	Număr de avize eliberate.
Actualizarea permanentă a bazei de date	4.3.8.	N	Număr de actualizări ale bazei de date.
Evaluarea rezultatelor implementării planului de management în al V-lea an și întocmirea noului plan	4.3.9.	P	Un raport final de activitate; un Plan de management revizuit.
Monitorizarea documentelor realizate de custode și menținerea unei arhive a acestora, a publicațiilor.	Toate activitățile	C	Registru de intrări-ieșiri.
Menținerea unei biblioteci cu studii și publicații despre aria protejată, precum și cu literatură de specialitate	Toate activitățile	C	Studii, publicații, literatură de specialitate.
Asigurarea faptului că toți cercetătorii și oamenii de teren depun rapoarte/copii ale muncii prestate	1.1.1., 1.1.2, 1.2.1., 1.2.2.	N	Contracte de cercetare, voluntariat, fișe de raportare.

Menținerea înregistrărilor activităților financiare ale ariei protejate	Toate activitățile	C	Acte contabile.
Monitorizarea documentelor realizate de custode și menținerea unei arhive a acestora, a publicațiilor.	Toate activitățile	C	Registru de intrări-ieșiri.

Legendă:

Frecvența: C - continuu; P - periodic; N - în funcție de necesități.

7. BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE

Ciochia V., 1991 - Zur entwicklung der Vogelwelt des Burzenlandes în den Jahren 1980 - 1988. Bohlau Verlag Koln Weimer Wien.

Coteș P, 1973 - Geomorfologia României. Editura Tehnică, București.

Hagemeijer E.J.M., Blair M.J., ed., 1997 - The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, T and A D Poyser, London.

Ionescu D.T., 1999 - Contributions to the study of the waterwofl from Dumbrăvița Lake and ponds - Bârsa Depression, Transylvania Review of Systematical and Ecological Research, nr. 1.

Ionescu D.T., 2002 - Contribuții la studiul avifaunei acvatice de interes cinegetic din Depresiunea Bârsei, Teză de Doctorat, Universitatea Transilvania din Brașov.

Ionescu D.T., 2002 - Aspecte ale migrației păsărilor de apă în Depresiunea Bârsei, Transilvania, România, Analele Banatului, serie nouă, Muzeul Banatului, Timișoara.

Ionescu D.T., 2002 - Some aspects of the black stork - *Ciconia nigra* migration in the south - east Transylvania, Romania, Acta Oecologica, vol. IX, nr. 1 - 2, Sibiu.

Ionescu D.T., 2003 - Considerații asupra răspândirii cârsteilor (*Rallus aquaticus* și *Porzana* sp.) din Depresiunea Bârsei (județul Brașov), Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr. 3, Brașov.

Ionescu D.T., 2003 - The threats and the trend of water bird populations în two fishpond areas from Bârsei Depression, Brașov County, Romania, Acta Oecologica, vol. X, nr. 1 - 2, Sibiu.

Ionescu D.T., 2003 - A management plan for two fish pond areas from the Bârsei Depression, Brașov County, Romania, Acta Oecologica, vol. X, nr. 1 - 2, Sibiu.

Ionescu D.T., 2004 - Criterion for legalization of two Special Protected Areas, Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, vol. 10, Tulcea.

Ionescu D.T., Iordache D., Popescu V., 2004 - Noutăți în protecția zonelor umede din județul Brașov, Revista Pădurilor, nr. 5, București.

Munteanu D., Papadopol A., Weber P., 2002 - Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediția II, Publicațiile Societății Ornitologice Române, nr. 16, Cluj - Napoca.

Oltean M. și al., 1994 - Lista roșie a plantelor superioare din România, Inst. De Biologie. Studii sinteze, documentații de ecologie, 1:1-52, București.

Papp T., Fântână C., ed., 2008 - Ariile de Importanță Avifaunistică din România, publicație comună a SOR și Asociației "Grupul Milvus", Târgu - Mureș.

Tucker G. M., Evans M. I., 1997 - Habitats for birds în Europe: a conservation strategy for the wider environment, BirdLife Internațional Conservation Series nr. 6, Cambridge.

*** , Baza de date a Societății Ornitologice Române - Sucursala Brașov.

*** , "Procesul de elaborare a planurilor de management pentru arii protejate din România" - manual și instrumente - elaborat de Michael R Appleton în cadrul proiectului " Managementul conservării biodiversității în România" - facilitare și asistență tehnică în schimbările instituționale, proiect al Băncii Mondiale numărul RO-GE-44176.

*** , Ramsar Information Sheet - RIS pentru declararea Complexului Piscicol Dumbrăvița ca Sit Ramsar.

*** , 2004 - BirdLife Internațional: Birds în the European Union: a status assessment. Wageningen.

*** , 2004 - Birdlife Internațional: Birds în Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge.

*** , 2004 - Cercetări privind inventarierea faunei sălbatice - pești, păsări, mamifere din Ariile Protejate: Parcul Natural Bucegi, Dealul Cetății - Lempes, Mlaștina eutrofă și Pădurea Prejmer, Lacurile Rotbav și Dumbrăvița - Arii de Protecție Specială Avifaunistică, Temă de cercetare a Facultății de Silvicultură Brașov, beneficiar Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

*** , 2004 - România, Mediul și Rețeaua Electrică de Transport, Ed. Academiei Române, București.

*** , 2004 - Plan de Management Sit Natura 2000, propunerea unui ghid metodologic, Twining Project Phare 2004/IB/EN - 03.

*** , 2006 - Recomandări pentru planurile de management pentru situri Natura 2000 în România, Twining Project RO2006/IB/EN-02 Phase II.

*** , 2009 - Proiectul bulgaro-român de cartarea a pădurilor cu importanță biologică ridicată, Societatea Ornitologică Română/Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, finanțat de Aage V. Jensen Charity Foundation, Danemarca.

*** , 2013 - Plan de Management al Parcului Național Piatra Craiului.

*** , 2014 - S.C. GISCOTOP CV S.R.L., Raport final în cadrul contractului "Realizare studii de inventariere, cartare si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management pentru ariile protejate ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, ROSPA0093 Pădurea Bogata si ROSCI0137 Pădurea Bogății", în cadrul proiectului "Managementul durabil al ariilor protejate Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, Pădurea Bogății și Pădurea Bogata" - SMIS-CSNR 43047.

*** , 2014, Structura planului de management și recomandări de completare în scopul integrării respectivelor planuri de management în SINCRON și Structura recomandată a datelor geospațiale ce fac parte integrantă din planul

de management în scopul integrării respectivelor date în SINCRO" realizat în cadrul proiectului "Sistem integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura 2000-SINCRO", proiect derulat de către Agenția Națională de Protecție a Mediului în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, disponibil online http://www.anpm.ro/proiect-sincron/-/asset_publisher/M5dL2rWIKHI6/content/structura-plan-de-management-date-geospatiale-nomenclatoare-sincron?_101_INSTANCEM5dL2rWIKHI6_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fproiect-sincron%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M5dL2rWIKHI6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fproiect-sincron%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M5dL2rWIKHI6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

8. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT

ANEXA Nr. 1

Angajament bugetar

ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei	Resurse disponibile - lei						Resurse necesare - lei				Lipsa financiară - lei			
	Total						Minim pentru implementare plan		Implementare optimă plan		Minim pentru implementare plan		Implementare optimă plan	
Programe, obiective, activități	Buget național	Surse internaționale	Surse private	Venituri proprii	Zile om	Fonduri	Zile om	Fonduri	Zile om	Fonduri	Zile om	Fonduri	Zile om	Fonduri
Program 1. Managementul biodiversității														
Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora														
1.1.1, 1.1.2	0	0	0	0	0	0	90	36.429	90	72.857	90,00	36.428,57	90,00	72.857,14
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	0	90	36.429	90	72.857	90,00	36.428,57	90,00	72.857,14
Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național														
1.2.1, 1.2.2	0	0	0	0	0	0	200	80.952	200	161.905	200,00	80.952,38	200,00	161.904,76
Investiții														
1.2.1, 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Subtotal	0	0	0	0	0	0	200	110.952	200	221.90	200,0	110.95	200,00	221.904,76

O.2.										5	0	2,38		
Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes național/comunitar														
1.3.1. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14	0	0	0	0	0	0	600	242.857	600	485.714	600,00	242.857,14	600,00	485.714,29
Investiții														
1.3.1. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00
Subtotal O.3.	0	0	0	0	0	0	600	442.857	600	785.714	600,00	442.857,14	600,00	785.714,29
Program 2. Vizitare, turism														
Obiectiv specific 1: Promovarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului														
2.1.1, 2.1.2.	0	0	0	0	0	0	100	40.476	100	80.952	100,00	40.476,19	100,00	80.952,38
Investiții														
2.1.1, 2.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	300.000	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	0	100	140.476	100	380.952	100,00	140.476,19	100,00	380.952,38
Program 3. Conștientizare și educație														
Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului														
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5.	0	0	0	0	0	0	300	121.429	300	242.857	300,00	121.428,57	300,00	242.857,14
Investiții														
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5.	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	200.000	0,00	120.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	0	300	241.429	300	442.857	300,00	241.428,57	300,00	442.857,14
Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului														
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3	0	0	0	0	0	0	150	60.714	150	121.429	150,00	60.714,29	150,00	121.428,57
Investiții														

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	120.000	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00
Subtotal O.2.	0	0	0	0	0	0	150	140.714	150	241.429	150,00	140.714,29	150,00	241.428,57
Program 4. Management și administrare														
Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate														
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	0	0	0	0	0	0	50	20.238	50	40.476	50,00	20.238,10	50,00	40.476,19
Investiții														
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	350.000	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	0	50	270.238	50	390.476	50,00	270.238,10	50,00	390.476,19
Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente														
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3	0	0	0	0	0	0	60	24.286	60	80.952	60,00	24.285,71	60,00	80.952,38
Subtotal O.2.	0	0	0	0	0	0	60	24.286	60	80.952	60,00	24.285,71	60,00	80.952,38
Obiectiv specific 3: Realizarea și coordonarea eficientă a activităților administrative														
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9	0	0	0	0	0	0	300	121.429	300	242.857	300,00	121.428,57	300,00	242.857,14
Investiții														
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	100.000	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal O.3.	0	0	0	0	0	0	300	171.429	300	342.857	300,00	171.428,57	300,00	342.857,14
Total investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.310.000,00
Total general cheltuieli 5 ani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.578.809,52	1.850,00	2.960.000,00	1.850,00	1.578.809,52	1.850,00	2.960.000,00

ANEXA Nr. 2

Zonarea internă a ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei

Aria Dumbrăvița

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Dumbrăvița 1

Suprafața de teren parte a parcelelor A2105, A2134, A2099, F2102, Unitatea Administrativ Teritorială Dumbrăvița, cuprinsă între:

- a) la nord: DJ 112 C - limita nordică a sitului;
- b) la vest: o linie care unește DJ 112 C și digul de protecție din luncă;
- c) la sud: cărarea/drumul de căruță de la baza terasei ce delimitează lunca de pantă/terasă, care este limita Ariei de Protecție Specială Avifaunistică "Complexul Piscicol Dumbrăvița";
- d) la est: linia dreaptă ce unește cărarea de la baza terasei, ultimul stâlp electric și DJ 112 C, care este limita Ariei de Protecție Specială Avifaunistică "Complexul Piscicol Dumbrăvița".

Reguli urbanistice în Zona de Dezvoltare Sustenabilă Dumbrăvița 1:

- 1) regimul construcțiilor va fi cel mult P + 2E sau P + E + M;
- 2) construcțiile vor fi doar tip casă sau cabană, fiind interzise: localurile publice: discotecă, bar, restaurant, terasă și altele asemenea sau alte construcții cu activități umane producătoare de zgomote exterioare;
- 3) pentru fiecare parcelă în parte, construcțiile propriu zise se vor realiza doar între DJ 112 C Dumbrăvița - Satu Nou și jumătatea fiecărei parcele.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Dumbrăvița 2

Suprafața de teren parte a parcelei PS 1941, Unitatea Administrativ Teritorială Dumbrăvița, cuprinsă între:

- a) la sud: DJ 112 C;
- b) la vest: drumul de căruță/pământ ce pleacă din DJ 112 C și urcă paralel cu liziera estică a trupului de pădure/pășune împădurită;
- c) la nord: punctul de intersecție al drumului de căruță descris anterior cu liziera vestică a pădurii Noului;
- d) la est: liziera vestică a pădurii Noului până la intersecția cu DJ 112 C.

Reguli urbanistice în Zona de Dezvoltare Sustenabilă Dumbrăvița 2:

- 1) o parcelă construibilă va avea minimum 700 mp;
- 2) regimul construcțiilor va fi cel mult P + 2E sau P + E + M;
- 3) culorile fațadelor vor fi în ton cu peisajul înconjurător;
- 4) se vor planta aliniamente cu arbori/arbuști pe trei laturi: pădurea Noului, trupul de pădure de la vest, zona DJ 112 C. Speciile, lățimea benzilor, se vor stabili ulterior împreună cu custodele;
- 5) construcțiile vor fi doar tip casă sau cabană, fiind interzise: localurile publice: discotecă, bar, restaurant, terasă și altele asemenea sau alte construcții cu activități umane producătoare de zgomote exterioare;
- 6) minimum 20% din suprafață va fi spațiu verde corelat cu habitatele înconjurătoare.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Hălchiu - Satu-Nou

Suprafața de teren parte a parcelei A66, Unitatea Administrativ Teritorială Hălchiu, cuprinsă între:

a) la nord: DJ 112 C - limita nordică a sitului și canalul 872 care se desprinde din acest DJ;

b) la vest: limita între parcele/loturile paralele și perpendiculare;

c) la sud: drumul de exploatare agricolă de la baza terasei;

d) la est: limita estică a Sitului ce unește DJ 112 C și drumul de exploatare agricolă.

Reguli urbanistice în Zona de Dezvoltare Sustenabilă Hălchiu - Satu-Nou:

1) regimul construcțiilor va fi cel mult P + 2E sau P + E + M;

2) construcțiile vor fi doar tip casă sau cabană, fiind interzise: localurile publice: discotecă, bar, restaurant, terasă și altele asemenea sau alte construcții cu activități umane producătoare de zgomote exterioare;

3) pentru fiecare parcelă în parte, construcțiile propriu-zise se vor realiza doar între DJ 112 C Satu Nou - Dumbrăvița și jumătatea fiecărei parcele.

Aria Rotbav

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Feldioara - Sat Rotbav 1

Suprafața de teren aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Feldioara, de formă relativ triunghiulară care unește malul nordic al bălții nr. 3 Rotbav și malul vestic al bălții nr. 4 Rotbav.

Reguli urbanistice în Zona de Dezvoltare Sustenabilă Feldioara - Sat Rotbav 1:

1) construcțiile se vor realiza la minimum 7 m de malul bălților;

2) regimul construcțiilor va fi cel mult P + 2E sau P + E + M;

3) construcțiile vor fi doar tip casă sau cabană, fiind interzise: localurile publice: discotecă, bar, restaurant, terasă și altele asemenea sau alte construcții cu activități umane producătoare de zgomote exterioare;

4) se interzic pontoanele sau alte tipuri de construcții la malul apei.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Feldioara - Sat Rotbav 2

Suprafața de teren aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Feldioara, ocupată de stația de betoane și depozitele de materiale aferente, din colțul sud-vestic al heleșteului nr. 1 - Vadu Roșu, inclusiv trei parcele de teren lipite de stație, aflate la sudul acesteia, transformate parțial în depozit de balast.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Măieruș - Sat Arini

Suprafața de teren aparținând Unitatea Administrativ Teritorială Măieruș, cuprinsă între:

a) la nord: grădinile caselor din Arini;

b) la vest: canalul și drumul de pământ;

c) la est: canalul și drumul de pământ;

d) la sud: limita între parcele și Balta Arini;

Aria Măgura Codlei

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Codlea 1

Suprafețele de teren aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Codlea, denumite Maial și Groapa Calului, cuprinse între:

- a)** la nord: DN1 și liziera pădurii;
- b)** la vest: liziera pădurii;
- c)** la est: DN1;
- d)** la sud: intravilanul construit al Municipiului Codlea și liziera pădurii de pe valea Maial.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Codlea 2

Suprafața de teren, aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Codlea din zona ștrandului Codlea, cuprinsă între:

- a)** la nord: zona de agrement, liziera pădurii ce desparte drumul până la zona de agrement și cabana;
- b)** la vest: liziera pădurii de la limita zonei de agrement;
- c)** la est: liziera pădurii de la limita zonei de agrement și cabanei;
- d)** la sud: liziera pădurii de la limita zonei de agrement.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Codlea 3

Suprafața de teren, aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Codlea din jurul fermei de animale, cuprinsă între:

- a)** la nord: limita nordică a sitului;
- b)** la vest: liziera pădurii de la limita terenului fermei;
- c)** la est: liziera pădurii de la limita terenului fermei;
- d)** la sud: liziera pădurii de la limita terenului fermei.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Codlea 4

Suprafața de teren, aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Codlea din zona văii Geamăna, cuprinsă între:

- a)** la nord: drumul de pe valea Geamăna;
- b)** la vest: liziera pădurii la limita pășunii;
- c)** la est: limita estică a sitului;
- d)** la sud: liziera pădurii la limita pășunii.

Zona de Dezvoltare Sustenabilă Codlea 5

Suprafața de teren, aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Codlea din zona văii Geamăna, cuprinsă între:

- a)** la nord: drumul de pe valea Geamăna și liziera pădurii;


- b) la vest: drumul de pe valea Geamăna;
- c) la est: liziera pădurii la limita pășunii;
- d) la sud: liziera pădurii la limita pășunii.


Zona de Dezvoltare Sustenabilă Codlea 6

Suprafața de enclavă forestieră, aparținând de Unitatea Administrativ Teritorială Codlea din jurul Cabanei Păstrăva - valea Păstrăva.

ANEXA Nr. 3


Hărți cu localizarea ariei protejate






ANEXA Nr. 4

Hărți cu limitele ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei și
suprapunerea cu alte arii protejate





ANEXA Nr. 5



Harta geomorfologică





ANEXA Nr. 8

Harta pedologică







**II. HARTA ZONEI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ (ZDS) DUMBRĂVIȚA 2, UAT
DUMBRĂVIȚA**
(Ortofotoplan Stereo 70, Scara 1:7000)



Legenda:

- Contur galben cu hașură – suprafața Zonei de Dezvoltare Sustenabilă (ZDS) Dumbrăvița 2

III. HARTA ZONEI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ (ZDS) HĂLCHIU - SATU NOU, UAT HĂLCHIU
(Ortofotoplan Stereo 70, Scara 1:8000)



Legenda:

- Contur galben cu hașură – suprafața Zonei de Dezvoltare Sustenabilă (ZDS) Hălchiu - Satu Nou

**IV. HARTA ZONEI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ (ZDS) FELDIOARA SAT ROTBAV,
UAT FELDIOARA
(Ortofotoplan Stereo 70, Scara 1:25000)**



Legenda:

- Contur galben cu hașură – suprafața Zonei de Dezvoltare Sustenabilă (ZDS) Feldioara Sat Rotbav

V. HARTA ZONEI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ (ZDS) MĂIERUȘ – ARINI, UAT MĂIERUȘ
(Ortofotoplan Stereo 70, Scara 1:7500)



Legenda:

- Contur galben cu hașură – suprafața Zonei de Dezvoltare Sustenabilă (ZDS) Măieruș - Arini

VI. HARTA ZONEI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ (ZDS) CODLEA 1, 2, UAT CODLEA
(Ortofotoplan Stereo 70, Scara 1:20000)



Legenda:

- Contur galben cu hașură – suprafața Zonei de Dezvoltare Sustenabilă (ZDS) Codlea 1, 2

VII. HARTA ZONEI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ (ZDS) CODLEA 3, 4, 5, UAT CODLEA
(Ortofotoplan Stereo 70, Scara 1:15000)



Legenda:

- Contur galben cu hașură – suprafața Zonei de Dezvoltare Sustenabilă (ZDS) Codlea 3, 4, 5

VIII. HARTA ZONEI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ (ZDS) CODLEA 6, UAT CODLEA
(Ortofotoplan Stereo 70, Scara 1:2000)



Legenda:

- Contur galben cu hașură – suprafața Zonei de Dezvoltare Sustenabilă (ZDS) Codlea 6

ANEXA Nr. 15

Hărți cu traseele de vizitare din aria protejată

